Инструкция по применению
Локоид Мазь 0,1 % 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Италия
Производитель: ЛЕО ФАРМА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гидрокортизона 17-бутират
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,1%
Срок годности: 60



Действующее вещество

Гидрокортизона 17-бутират

Состав

Мазь для наружного применения 0,1% 1 г - активное вещество: гидрокортизона 17-бутират 1 мг, вспомогательные вещества: полиэтиленовая мазевая основа (масло вазелиновое 95%, ПЭ 5%)

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Всасывание: После аппликации происходит накопление активного вещества в эпидермисе, в основном в зернистом слое, системная абсорбция незначительна. Небольшое количество гидрокортизона 17-бутирата всасывается в системный кровоток в неизмененном виде. Метаболизм: Большая часть гидрокортизона 17-бутирата метаболизируется до гидрокортизона и других метаболитов непосредственно в эпидермисе и в последующем в печени. Выведение: Метаболиты и незначительная часть неизмененного гидрокортизона 17-бутирата выводится почками и через кишечник.

Показания

Поверхностные неинфицированные, чувствительные к местным ГКС, заболевания кожи: дерматиты, в т. ч. атопический, контактный, себорейный, экзема, псориаз.

Способ применения и дозы

Наружно. Локоид в форме мази используется при подострых и хронических процессах, в особенности при наличии лихенификации, инфильтрации, сухости. Препарат наносят на пораженные участки кожи тонким слоем 1–3 раза в сутки. При появлении положительной динамики кратность применения препарата можно уменьшить до 2–3 раз в неделю. Для улучшения проникновения препарат наносят массирующими движениями. В случаях резистентного течения заболеваний, например при локализации плотных псориатических бляшек на локтевых областях, коленях, препарат можно применять под окклюзионные повязки. Доза препарата, используемая в течение недели, не должна превышать 30–60 г.

Противопоказания

Гиперчувствительность к гидрокортизону или вспомогательным компонентам препарата,бактериальные инфекции кожи (стрепто- и стафилодермии, грамотрицательный фолликулит и т. д.),вирусные инфекции кожи (простой герпес, ветряная оспа, опоясывающий лишай и т. д.), грибковые инфекции кожи, туберкулезные и сифилитические поражения кожи, паразитарные инфекции кожи, неопластические изменения кожи (доброкачественные и злокачественные опухоли), акне, розацеа, периоральный дерматит, поствакцинальный период, нарушение целостности кожных покровов (раны, язвы). С осторожностью: беременность, период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

ГКС проникают через плаценту. Воздействие на плод может быть особенно выраженным при нанесении препарата на большие поверхности. Нет данных о количестве гидрокортизона, выделяющегося с грудным молоком; рекомендуется соблюдать особую осторожность при назначении препарата в период лактации

Побочные действия

Местные реакции: раздражение кожи, в редких случаях , другие местные реакции, характерные для местной стероидной терапии. Системные реакции: при длительном применении, нанесении на большие поверхности или использовании окклюзионных повязок могут наблюдаться побочные эффекты, характерные для системных ГКС. Риск возникновения местных и системных побочных эффектов при применении Локоида ниже, чем при использовании фторированных стероидов.

Передозировка

Данных о передозировке Локоида нет. Симптомы: при длительном применении препарата в высоких дозах возможно усиление описанных выше побочных эффектов. При появлении симптомов гиперкортицизма препарат следует отменить.

Взаимодействие с другими препаратами

Данных о лекарственных взаимодействиях Локоида нет.

Особые указания

Не следует наносить Локоид на периорбитальную область в связи с риском развития глаукомы. При систематическом попадании на конъюнктиву возникает риск увеличения внутриглазного давления. Любые ГКС для наружного применения в форме мази нежелательно применять на волосистой части головы, а также при остром воспалении (особенно экссудативном). Для лечения стероидчувствительных кожных поражений, локализующихся в области лица, складок, гениталий, а также на участках кожи с обильным волосяным покровом предпочтительнее использовать Локоид, крем и Локоид Крело. Препарат нежелательно использовать при наличии атрофических изменений кожи. Риск возникновения местных и системных побочных эффектов увеличивается при нанесении на обширные участки поражения, длительном применении, использовании окклюзионных повязок и в детском возрасте. При отсутствии эффекта в течение 2 нед непрерывного лечения следует уточнить диагноз. Как и при использовании любого ГКС, желательно ограничивать продолжительность применения и курсовую дозу минимально достаточной для купирования кожного процесса. Применение в педиатрии: Возможно применение у детей с 6-месячного возраста. В случаях применения препарата у детей, в области лица или под окклюзионные повязки продолжительность курса лечения необходимо сокращать. При использовании у детей площадь поверхности кожи, на которую наносится препарат, не должна превышать 20% от общей. В детском возрасте подавление функции коры надпочечников может развиться быстрее. Кроме того, может наблюдаться снижение экскреции гормона роста. При применении препарата в течение длительного времени необходимо наблюдать за массой тела, ростом, уровнем кортизола плазмы. В исследовании у детей, получавших по 30–60 г Локоида в неделю на протяжении 4 нед, в сравнении с применением 1% мази гидрокортизона, ни у одного ребенка не было выявлено нарушений функции коры надпочечников, т. е. отличий гидрокортизона 17-бутирата по данному показателю от обычного гидрокортизона не наблюдалось. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмамиДанных о влиянии Локоида на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами нет

Условия хранения

Беречь от детей