Инструкция по применению
Лопедиум Таблетки 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Салютас Фарма ГмбХ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лоперамид
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 2 мг
Срок годности: 60.0



Описание

Лопедиум 2 мг – это лекарственный препарат, предназначенный для лечения симптомов диареи различного происхождения. В состав препарата входит лоперамид, который оказывает антидиарейное действие, устраняя излишнюю подвижность кишечника и уменьшая количество стула. Лекарство доступно в форме таблеток для приема внутрь. Рекомендуется принимать взрослым и детям старше 6 лет при острой диарее начальная доза - 2 таблетки (4 мг) для взрослых и 1 таблетка (2 мг) для детей, далее по 1 таблетке (2 мг) после каждого акта дефекации в случае жидкого стула. Максимальная суточная доза не должна превышать 6 таблеток (12 мг) При нормализации стула или при отсутствии стула более 12 ч препарат отменяют. Перед использованием препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Действующее вещество

Лоперамид

Состав

Лоперамида гидрохлорид 2 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, кальция гидрофосфата дигидрат, крахмал кукурузный, натрия крахмала гликолат, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывание. Абсорбция лоперамида - 40%. Время достижения Cmax составляет 2.5 ч. Распределение. Связывание с белками плазмы - 97%. Не проникает через ГЭБ. Метаболизм. Практически полностью метаболизируется в печени путем конъюгации. Выведение. Выводится преимущественно с желчью и мочой. T1/2 составляет 9-14 ч.

Показания

Симптоматическое лечение острой и хронической диареи различного генеза (в т.ч. аллергического, эмоционального, лекарственного, лучевого; при изменении режима питания и качественного состава пищи, при нарушении метаболизма и всасывания; как вспомогательное средство при диарее инфекционного генеза). Регуляция стула у пациентов с илеостомой.

Способ применения и дозы

Взрослым при острой диарее первая доза - 4 мг, затем - по 2 мг после каждого акта дефекации в случае жидкого стула. При хронической диарее первая доза составляет 2 мг, поддерживающую дозу подбирают так, чтобы частота стула составляла 1-2 раза в сут (2-12 мг/). Максимальная суточная доза для взрослых составляет 16 мг. Детям в возрасте 4-8 лет - по 1 мг 3-4 в течение 3 дней; 9-12 лет - по 2 мг 4 в течение 5 дней.

Противопоказания

Кишечная непроходимость; запор, вздутие живота, субилеус, острая дизентерия (в качестве монотерапии), острый язвенный колит, псевдомембранозный колит, возникшие вследствие применения антибиотиков широкого спектра действия; детский возраст до 4 лет, I триместр беременности, повышенная чувствительность к лоперамиду.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: боли в животе, вздутие, тошнота, запор, сухость во рту. Со стороны ЦНС: повышенная утомляемость, сонливость, головокружение. Аллергические реакции: кожная сыпь.

Взаимодействие с другими препаратами

Полагают, что при одновременном применении колестирамин может уменьшать эффективность лоперамида. При одновременном применении с ко-тримоксазолом, ритонавиром повышается биодоступность лоперамида, что обусловлено ингибированием его метаболизма при "первом прохождении" через печень. При передозировке лоперамида в качестве антидота используют налоксон.

Особые указания

С осторожностью применяют при печеночной недостаточности. Не следует применять в клинических ситуациях, когда требуется угнетение перистальтики кишечника. При отсутствии эффекта через 2 сут применения лоперамида необходимо уточнить диагноз и исключить инфекционный генез диареи. С осторожностью применяют у пациентов с нарушениями функции печени. При передозировке лоперамида в качестве антидота используют налоксон.

Условия хранения

В сухом месте