Инструкция по применению
Лорагексал Таблетки 10мг 10шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лоратадин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 10 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Лоратадин

Состав

Лоратадин 10 мг.; Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 69.175 мг, крахмал кукурузный - 18 мг, кремния диоксид коллоидный безводный - 1.825 мг, магния стеарат - 1 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При приеме внутрь препарат хорошо всасывается из ЖКТ. Абсорбция препарата не зависит от приема пищи.; Действие препарата начинается через 30 мин после приема 1 таблетки и продолжается в течение 24 ч. Лоратадин метаболизируется в печени с образованием активного метаболита дезкарбоэтоксилоратадина. Cmax лоратадина и его активного метаболита в плазме крови достигаются через 1.3-2.5 ч после приема 1 таблетки Лорагексала.

Показания

Для взрослых и детей старше 2 лет: — сезонный и круглогодичный аллергический ринит, конъюнктивит, поллиноз, крапивница, в т.ч. хроническая идиопатическая крапивница; — отек Квинке; — псевдоаллергические реакции; — зудящие дерматозы; — аллергические реакции на укусы насекомых.

Способ применения и дозы

Применяется внутрь.; Взрослым и детям старше 12 лет - по 10 мг (1 таб.) 1 раз/сут. Суточная доза - 10 мг.; Детям от 2 до 12 лет - по 5 мг (1/2 таб/) 1 раз/сут. Суточная доза - 5 мг.; Детям с массой тела более 30 кг - по 10 мг (1 таб/) 1 раз/сут. Суточная доза -10 мг.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Следует воздержаться от применения Лорагексала при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Редко: сухость во рту, тошнота, рвота, гастрит, нарушение функции печени, головная боль, повышенная утомляемость, возбудимость (у детей), головокружение, кашель, тахикардия, аллергические реакции.; В отдельных случаях: алопеция.

Передозировка

Симптомы: сонливость, тахикардия, головная боль.; Лечение: принять меры по удалению препарата из ЖКТ и снижению абсорбции.

Взаимодействие с другими препаратами

При использовании лоратадина в терапевтических дозах не выявлено его взаимодействия с алкоголем.; Эритромицин, циметидин, кетоконазол при совместном применении с лоратадином увеличивают концентрацию лоратадина в плазме крови, не вызывая клинических проявлений и не влияя на ЭКГ

Особые указания

Больным с нарушениями функций печени Лорагексал необходимо назначать в начальной дозе 5 мг/сут в связи с возможным нарушением клиренса лоратадина.; Не рекомендуется детям до 2-х лет.

Условия хранения

В сухом месте