Инструкция по применению
Лоратадин-Вертекс Таблетки 10 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вертекс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лоратадин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 10 мг



Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета с фаской.

Действующее вещество

Лоратадин

Состав

Препарат Лоратадин - ВЕРТЕКС содержит: Действующим веществом является лоратадин. Каждая таблетка содержит 10 мг лоратадина. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмал гликолят, тип А), кальция стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Лоратадин - ВЕРТЕКС показан к применению у взрослых и детей с 3 лет (с массой тела более 30 кг) при: сезонном (поллиноз) и круглогодичном аллергическом рините и аллергическом конъюнктивите для устранения симптомов, связанных с этими заболеваниями: чихание, зуд слизистой оболочки носа, ринорея, ощущение жжения и зуда в глазах, слезотечение, хронической идиопатической крапивнице. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, Вам необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат Лоратадин - ВЕРТЕКС в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями Вашего лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза Рекомендованный режим дозирования у взрослых - 1 таблетка (10 мг) 1 раз в день. Особые группы пациентов Пациенты с нарушением функции печени Взрослым и детям при массе тела более 30 кг с тяжелым нарушением функции печени начальная доза должна составлять 10 мг (1 таблетка) через день. Если у Вас или Вашего ребенка имеется тяжелое заболевание печени, проконсультируйтесь с врачом. Применение у детей и подростков Не давайте препарат детям до 3 лет и массой тела менее 30 кг. Режим дозирования у детей в возрасте от 3 лет и с массой тела более 30 кг соответствует режиму дозирования у взрослых. Путь и (или) способ введения Препарат Лоратадин - ВЕРТЕКС следует принимать внутрь, независимо от времени приема пищи. Продолжительность терапии Продолжительность лечения препаратом для Вас определит врач. Если Вы приняли препарата Лоратадин - ВЕРТЕКС больше, чем следовало При передозировке препаратом Лоратадин - ВЕРТЕКС возможны следующие симптомы: сонливость, учащенное сердцебиение (тахикардия), головная боль. Если Вы приняли препарата Лоратадин - ВЕРТЕКС больше, чем предусмотрено, Вам необходимо немедленно обратиться к врачу. Если есть возможность, возьмите с собой упаковку препарата, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли. Если с момента передозировки препаратом прошло мало времени, рекомендован прием активированного угля или других адсорбентов (в соответствии с инструкцией по медицинскому применению). Если Вы забыли принять препарат Лоратадин - ВЕРТЕКС Вы должны использовать препарат с частотой, назначенной Вам лечащим врачом, или как указано в листке-вкладыше, так как регулярность приема делает лечение более эффективным. Тем не менее, если Вы забыли принять лекарственный препарат, используйте следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную. Если у Вас есть вопросы по применению лекарственного препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Противопоказания

Не принимайте препарат Лоратадин - ВЕРТЕКС: если у Вас имеется аллергия на лоратадин или на какой-либо из компонентов препарата (перечисленных в разделе 6 листка-вкладыша), если Вы кормите грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. В качестве меры предосторожности желательно избегать применения препарата Лоратадин - ВЕРТЕКС во время беременности. Лоратадин и его активный метаболит выделяются в грудное молоко, поэтому при назначении лекарственного препарата в период грудного вскармливания следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания с Вашим лечащим врачом.

Побочные действия

Возможные нежелательные реакции Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Лоратадин - ВЕРТЕКС может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. После применения лекарственного препарата могут возникнуть реакции гиперчувствительности (аллергические реакции). Эти реакции могут быть серьезными. Вам следует прекратить прием лекарственного препарата и получить немедленную медицинскую помощь при появлении таких симптомов, как: отек лица, языка или глотки, проблемы с глотанием, крапивница, покраснения на всей поверхности тела, образование волдырей, шелушение и отек кожи, воспаление слизистых оболочек, хрипы или затрудненное дыхание. В порядке убывания по частоте возникновения, нежелательные реакции могут быть следующими: очень редко - могут возникать не более чему 1 человека из 10000: аллергические реакции (включая такие тяжелые аллергические реакции, как ангионевротический отек и анафилаксию), головокружения, судороги, тахикардия (учащенное сердцебиение) сердцебиение (ощущение сердцебиения), сухость во рту, тошнота, гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка), нарушения функции печени, сыпь, аллопеция (выпадение волос), утомляемость. неизвестно - исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно: увеличение массы тела.

Передозировка

При передозировке препаратом Лоратадин - ВЕРТЕКС возможны следующие симптомы: сонливость, учащенное сердцебиение (тахикардия), головная боль. Если Вы приняли препарата Лоратадин - ВЕРТЕКС больше, чем предусмотрено, Вам необходимо немедленно обратиться к врачу. Если есть возможность, возьмите с собой упаковку препарата, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли. Если с момента передозировки препаратом прошло мало времени, рекомендован прием активированного угля или других адсорбентов (в соответствии с инструкцией по медицинскому применению).

Взаимодействие с другими препаратами

Другие препараты и препарат Лоратадин - ВЕРТЕКС Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Это связано с тем, что препарат Лоратадин - ВЕРТЕКС может повлиять на действие других препаратов или, наоборот, может увеличить риск и степень серьезности нежелательных реакций. Обязательно поставьте в известность лечащего врача, если Вы принимаете: ингибиторы CYP3A4 или CYP2D6, кетоконазол и эритромицин (ингибиторы изофермента CYP3A4), циметидином (ингибиторы изоферментов CYP3A4 и CYP2D6), препараты, угнетающие печеночный метаболизм.

Особые указания

Перед приемом препарата Лоратадин - ВЕРТЕКС проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Принимайте Лоратадин - ВЕРТЕКС с осторожностью в случае, если у Вас тяжелые нарушения функции печени. Если Вам предстоит проведение кожных аллергических проб, препарат Лоратадин - ВЕРТЕКС следует отменить не менее, чем за 48 часов до проведения проб, так как Лоратадин, как и другие антигистаминные препараты, может влиять на результаты диагностических тестов. Дети и подростки Препарат Лоратадин - ВЕРТЕКС не предназначен для применения у детей в возрасте до 3 лет и массой тела менее 30 кг в связи с тем, что данные по безопасности и эффективности препарата Лоратадин - ВЕРТЕКС у данной категории пациентов отсутствуют. Препарат Лоратадин - ВЕРТЕКС содержит лактозы моногидрат Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом лекарственного препарата Лоратадин - ВЕРТЕКС.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Не выявлено отрицательного действия препарата Лоратадин - ВЕРТЕКС на способность к управлению автомобилем или осуществлению другой деятельности, требующей повышенной концентрации внимания. Однако в очень редких случаях некоторые пациенты испытывают сонливость при приеме лоратадина, что может повлиять на их способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после слов "Годен до...". Датой истечения срока годности является последний день данного месяца. Храните препарат в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.