Инструкция по применению
Лоринден С Мазь 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Польша
Производитель: Валеант
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Клиохинол+Флуметазон
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Клиохинол+Флуметазон

Состав

Действующее вещество: Флуметазона пивалат 0,20 мг, Клиохинол (Йодхлороксихинолин) 30,0 мгВспомогательные вещества: воск белый, вазелин белыйКонцентрация действующего вещества (мг): 30,20 мг

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Всасывание и распределениеПри нанесении мази на кожу активные компоненты легко проникают через роговой слой.Флуметазона пивалат практически не абсорбируется в кровоток и не оказывает системного действия. Абсорбция увеличивается при частом применении препарата и/или нанесении на обширные участки кожи, при применении на лице, в области кожных складок, на участках кожи с поврежденным эпидермисом, а также при применении окклюзионной повязки, увеличивающей влажность и местную температуру (проникновение в глубокие слои кожи под окклюзионной повязкой примерно в 100 раз больше, чем при простом нанесении на пораженные участки).Абсорбция флуметазона пивалата из кожи у детей является более выраженным, чем у взрослых.Клиохинол при применении в виде мази, может незначительно абсорбироваться через кожу и связываться с белками плазмы крови.Метаболизм и выведениеФлуметазона пивалат практически не метаболизируется в коже. После всасывания, препарат главным образом, метаболизируется в печени. Выводится в виде метаболитов и небольшое количество в неизмененном виде с мочой и с желчью.Клиохинол частично биотрансформируется в печени и выводится с мочой.

Показания

аллергодерматозы, осложненные присоединением бактериальной инфекции, вызванной чувствительной к клиохинолу флорой:дерматит (в т.ч. аллергический, контактный, профессиональный, себорейный, солнечный),экзема;псориаз (особенно застарелые случаи), в т.ч. псориаз волосистой части головы;многоформная эритема; эритродермия;атопический дерматит (распространенный нейродермит);почесуха, дерматозы не поддающиеся лечению другими глюкокортикостероидами (в т.ч. красный плоский лишай, дискоидная красная волчанка);крапивница;вторичные инфекции при укусах насекомых.бактериальные и грибковые инфекции кожи, осложненные развитием местных аллергических реакций:импетиго;инфицированная опрелость;дерматомикоз, актиномикоз, бластомикоз, споротрихоз.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки. В начале лечения препарат применяют не чаще 2-3 раза в сутки, при появлении положительной динамики -1-2 раза в сутки.Препарат нельзя использовать больше 2-х недель. Если существует необходимость применения повязки, то следует использовать повязку, пропускающую воздух. При чрезмерной лихенизации и гиперкератозе, мазь применяют только под окклюзионной повязкой один раз в 24-48 часов. Не следует применять препарат более 1 недели.Если нет необходимости, не применять в течение суток больше 2 г мази.У подростков после 10 лет, применять только в исключительных случаях на ограниченных участках кожи, избегать нанесения препарата на кожу лица.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Вирусные заболевания кожи (герпес, ветряная оспа), туберкулез кожи, кожные проявления сифилиса, новообразования и предраковые состояния кожи (рак кожи, невус, атерома, эпителиома, меланома, гемангиома, ксантома, саркома). Вульгарные угри и розовые угри, периоральный дерматит, трофические язвы голени, связанные с варикозным расширением вен, состояния после вакцинации. Инфекции кожи (для окклюзионной повязки). Не применять препарат у детей до 10 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата в I триместре беременности. Контролируемых исследований возможного тератогенного действия при местном применении флуметазона и йодхлороксихинолина при беременности не проводилось, поэтому препарат можно назначать только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода.Неизвестно, в какой степени флуметазон и клиохинол при наружном применении выделяются с грудным молоком. Следует соблюдать особую осторожность при назначении препарата в период лактации (грудного вскармливания). Применение возможно только в исключительных случаях, кратковременно и на ограниченных участках кожи (нельзя наносить на кожу молочных желез).

Побочные действия

Редко: жжение, кожный зуд, стероидные угри, стрии, сухость кожи, фолликулит. При длительном применении - атрофия кожи, местный гирсутизм, телеангиоэктазия, пурпура, нарушения пигментации; при нанесении на большие поверхности возможны системные проявления глюкокортикостероида.

Передозировка

Случаи передозировки наблюдаются редко.Симптомы: при неправильном, частом или длительном применении в значительных количествах на обширных участках возможно появление системных побочных эффектов ГКС.Лечение: постепенная отмена препарата; симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Во время терапии Лоринденом С не следует проводить вакцинацию и иммунизацию в связи с иммунодепрессивным эффектом препарата.Препарат не следует назначать в комбинации с другими лекарственными средствами для наружного применения.При абсорбции препарата в системный кровоток флуметазон снижает эффективность инсулина, пероральных гипогликемических средств, антигипертензивных препаратов, антикоагулянтов, снижает концентрацию салицилатов и празиквантела в сыворотке крови.При совместном применении повышается риск развития побочных эффектов андрогенов, эстрогенов, пероральных контрацептивов, анаболических стероидов (гирсутизм, угревая сыпь); антипсихотических средств, букарбана, азатиоприна (катаракта); холиноблокаторов, антигистаминных препаратов, трициклических антидепрессантов, нитратов (глаукома); диуретиков (гипокалиемия), сердечных гликозидов (дигиталисная интоксикация).

Особые указания

Не рекомендуется наносить препарат на кожу лица, следует избегать попадания мази в глаза.Не рекомендуется увеличивать продолжительность курса лечения или применять длительно на обширных участках кожи. При продолжительном применении препарата на большой площади поверхности кожи повышается риск развития системных побочных эффектов ГКС.При появлении вторичной инфекции на месте применения мази следует использовать средства с более выраженным антибактериальным или противогрибковым действием.С осторожностью следует применять препарат при атрофических изменениях кожи, особенно у лиц пожилого возраста.При длительном применении возможно развитие резистентности микрофлоры к клиохинолу.При грибковых заболеваниях с вторичными аллергическими реакциями Лоринден С применяют в исключительных случаях, под врачебным контролем.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПрепарат не ограничивает психофизическую активность, способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию движущихся механизмов.

Условия хранения

В сухом месте