# Инструкция по применению
# Лоролизин Таблетки для рассасывания 20 мг + 10 мг 30 шт

## Характеристики




Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Россия
Производитель: Обнинская химико-фармацевтическая компания
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лизоцим+Пиридоксин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 20 мг+10 мг

## Описание

Круглые таблетки белого или желтовато-белого цвета с риской на одной стороне и фаской с двух сторон. Возможно наличие темных вкраплений.

## Действующее вещество

Лизоцим+Пиридоксин

## Состав

Действующие вещества: Лизоцима гидрохлорид 20,0 мг Пиридоксина гидрохлорид 10,0 мг Вспомогательные вещества: Лактозы моногидрат 155,4 мг, Камедь Астрагала трагакантового 10,0 мг, Магния стеарат 4,0 мг, Натрия сахаринат 0,5 мг, Ванилин 0,1 мг

## Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

## Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта, десен и гортани: гингивит, стоматит, катаральные явления в верхних отделах дыхательных путей, афтозные изъязвления, герпетические поражения (в составе комплексной терапии), эрозии слизистой оболочки полости рта любой этиологии.

**Способ применения и дозы**

Препарат применяется местно. Таблетки следует медленно рассасывать, не разжевывая, задерживая растаявшую массу таблетки в полости рта как можно дольше (вплоть до полного растворения). Детям в возрасте 3-7 лет обычно назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки, 7-12 лет – по 1 таблетке 4 раза в сутки. Взрослым и детям старше 12 лет – по 2 таблетки 3-4 раза в сутки. Длительность лечения – до 8 дней.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность, детский возраст до 3 лет. Наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Препарат может применяться во время беременности и периода кормления грудью.

**Побочные действия**

Аллергические реакции.

**Передозировка**

Симптомы передозировки маловероятны, могут отмечаться после применения в дозах, значительно превышающих терапевтические, и проявляться чувством онемения, ощущением покалывания, а также нарушением чувствительности в области верхних и нижних конечностей. Лечение: обильное питье (форсированный диурез).

**Взаимодействие с другими препаратами**

Препарат усиливает действие антибиотиков, в том числе бета-лактамных, хлорамфеникола, нитрофурантоина, усиливает действие диуретиков, ослабляет активность леводопы. Изониазид, пеницилламин, пиразинамид, иммуносупрессоры, эстрогены и пероральные контрацептивы могут усиливать потребность в пиридоксине (антагонистическое действие по отношению к пиридоксину или увеличение ренальной экскреции).

**Особые указания**

В случае появления аллергических реакций необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу. Влияние на способность управлять автотранспортом или работать с механизмами Не влияет на скорость психомоторных реакций.

**Условия хранения**

В оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка в пачке) при температуре не выше 30 °С.