Инструкция по применению
Лузеро Колготки моделир. с микрокап.черн. р s/m

Характеристики



Форма выпуска: Колготки
Страна: Россия
Производитель: Биофармиталия
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Колготки Lusero предназначены для моделирования контуров тела, улучшения эластичности и упругости кожи, для сокращения локализованных жировых отложений и предотвращения образования и развития целлюлита.Колготки Лусеро изготовлены из ткани на основе лайкры, которая проходит процесс инкапсуляции перед окраской и упаковкой. В волокна ткани заключены микрокапсулы.Колготки Lusero рекомендуется использовать как обычную одежду. Под действием температуры тела активные компоненты начинают непрерывно проникать в кожу и действуют равномерно в течение всего дня на все поверхности ног, ягодиц и живота.Действие микрокапсул с активными компонентами рассчитано на 7 дней. Активные вещества в волокнах ткани колготок устойчивы к воздействию влаги, благодаря чему колготки выдерживают 6 стирок. Используется ручная стирка с нейтральными моющими средствами при температуре 30°С.По истечении этого срока действие активных компонентов прекращается. Для продолжения моделирующего курса необходимо использовать новые колготки. Продолжительность моделирующего курса не менее 1 месяца.

Состав

Содержание микрокапсул: кофеин, экстракт иглицы понтийской, гидроиодит чая, пропилен гликоль, экстракт плюща обыкновенного, карнитин, эсцин (экстракт семян конского каштана), трипептид-1, ксантановая смола, каррагены (ирландский мох), карбомер, триетаноламин, дисодиум ЭДТА, гидроксиэтилмониум метасульфата, фосфолипиды, ПЭГ-8 глицериды каприловой кислоты, каприловая кислота - составляют 9,85%, экстракт центеллы азиатской - 2%, экстракт гинкго билоба - 2%, экстракт водорослей - 2%, имидазолодинил мочевины - 0,05%, феноксиэтанол - 0,06%, метилпарабен, бутилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен, изобутилпарабен - составляют 0,04%, вода - 54%, натрия борагеамидопропид PG - димониум хлорид - 30%.

Форма выпуска

Колготки

Показания

Антицеллюлитный уходПохудение

Способ применения и дозы

Основные принципы использования: компрессионные изделия можно использовать в стационарных и амбулаторных учреждениях, или дома, размер выбирают по окружности ноги, росту, по таблице размеров, снимать мерки нужно с утра (до появления отеков) или после того, как ноги отдохнули, поставив ногу горизонтально - это можно сделать самому или попросить помощи специалиста, изделие нужно надевать утром, как только будут завершены гигиенические процедуры, и носить весь день, если врач не прописал иначе,Порядок надевания/снятия, правила: перед надеванием компрессионных изделий рекомендуем снять с рук украшения, желательно использовать резиновые перчатки, держите верхнюю часть изделия двумя руками и соберите его складками до пятки, выверните наизнанку, вставьте в изделие большие пальцы и наденьте изделие на стопу, растягивая, расправьте, чтобы изделие было расположено прямо, не сжимало пальцы, слегка растягивая подушечками пальцев, равномерно натяните изделие до необходимого уровня, если изделие слишком растянуто по направлению вверх, спустите его до щиколотки и выровняйте до необходимого уровня, не растягивая снимая, также нужно снять украшения. возьмитесь за верхний край изделия обеими руками и растягивающими движениями стяните его в направлении стопы, аккуратно растягивающими движениями, снимите изделие со стопы и кончиков пальцев.Рекомендации по уходу: рекомендована ручная стирка при температуре 30°C, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей не тереть и не выжимать изделие после стирки тщательно прополоскать бандаж сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Противопоказания

Дерматиты. Острая инфекция мягких тканей ноги. Инфицированные трофические язвы. Тяжёлые формы сердечно-легочной недостаточности. Атеросклероз, эндоартериит нижних конечностей.