Инструкция по применению
Магний В6 форте Таблетки 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармгрупп
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Магний- важный катализатор ферментной деятельности. Способствует поглощению калия и кальция. Участвует в углеводном обмене, синтезе белков, обладает седативным действием, сосудорасширяющим и диуретическим эффектом.Витамин В6 (пиридоксин) улучшает усвоение ненасыщенных жирных кислот. Оказывает стимулирующее действие на кислообразующую функцию желудка и желчевыделительную функцию печени. Нормализует функциональное состояние печени.Круглые, двояковыпуклые, покрытые оболочкой таблетки, белого цвета, без запаха.

Состав

Магния аспарагинат, сахароза, воск пчелиный, тальк, титана диоксид, пиридоксина гидрохлорид (витамин В6).Содержание биологически активных компонентов в суточной дозе (2 таблетки), не менееМагний 60 мг (400 мг*)Витамин В6 2 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Желудочно-кишечная абсорбция магниевых солей происходит частично путем пассивного механизма, в котором растворимость соли играет определяющую роль. Степень этой абсорбции не превосходит 50%. Выведение происходит, преимущественно почками.

Показания

Установленный дефицит магния, изолированный или связанный с другими дефицитными состояниями, сопровождающийся такими симптомами, как повышенная раздражительность, незначительные нарушения сна, желудочно-кишечные спазмы, учащенное сердцебиение, повышенная утомляемость, боли и спазмы мышц, ощущение покалывания в мышцах.Если через месяц лечения отсутствует уменьшение этих симптомов продолжение лечения нецелесообразно.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке (0,5г) 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема- 1 месяц

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Побочные действия

Нарушения со стороны иммунной системы:Очень редко (Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:Неизвестная частота (по имеющимся данным оценить частоту возникновения не представляется возможным): диарея, боли в животе, тошнота, рвота, метеоризм.

Передозировка

СимптомыПри нормальной функции почек передозировка магния при приеме внутрь обычно не приводит к возникновению токсических реакций. Однако в случае почечной недостаточности возможно развитие отравления магнием.Симптомы передозировки, выраженность которых зависит от концентрации магния в крови: снижение артериального давления, тошнота, рвота, угнетение центральной нервной системы, снижение рефлексов, изменения на электрокардиограмме, угнетение дыхания, кома, остановка сердца и паралич дыхания, анурический синдром. ЛечениеРегидратация, форсированный диурез. При почечной недостаточности необходим гемодиализ или перитонеальный диализ.

Особые указания

Таблетки предназначены только для взрослых и детей старше 6 лет.При умеренной почечной недостаточности следует принимать препарат с осторожностью из-за риска развития гипермагниемии.При одновременном дефиците кальция и магния, дефицит магния следует восполнять до начала приема препаратов кальция или пищевых добавок, содержащих кальций.При применении пиридоксина в высоких дозах (более 200 мг в день) в течение длительного времени (в течение нескольких месяцев или в некоторых случаях - лет) может развиться сенсорная аксональная нейропатия, которая сопровождается такими симптомами, как онемение и нарушения проприоцептивной чувствительности, тремор дистальных отделов конечностей и постепенно развивающаяся сенсорная атаксия (нарушения координации движений). Эти нарушения обычно являются обратимыми и проходят после прекращения приема витамина B6.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.Хранить в недоступном для детей месте.