Инструкция по применению
Магвит капсулы 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Беларусь
Производитель: МИНСКИНТЕРКАПС
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Магния цитрат+Пиридоксин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 50 мг+5 мг

Описание

Капсулы твердые желатиновые №0 желтого цвета. Содержимое капсул - порошок белого или белого с легким желтоватым или сероватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Магния цитрат+Пиридоксин

Состав

1 капсула содержит: Активные вещества: пиридоксина гидрохлорид - 5,0 мг, магния цитрат - 350,0 мг (в пересчете на магний - 50,0 мг). Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 45,2 мг, магния стеарат - 2,5 мг, лактоза - достаточное количество для получения содержимого капсулы массой 500,0 мг. Состав оболочки желатиновых капсул: желатин - 81,19 мг, глицерол - 0,122 мг, вода очищенная - 13,92 мг, натрия лаурилсульфат - 0,056 мг, титана диоксид - 0,644 мг, краситель: хинолиновый желтый Е-104 - 0,055 мг, краситель: солнечный закат желтый Е-110 - 0,013 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Всасывание магния в желудочно-кишечном тракте составляет 50 % от принимаемой внутрь дозы. В организме магний распределяется в основном во внутриклеточном пространстве (около 99 %). Основным путем выведения магния является мочевыделительная система. Экскреция подчиняется циркадному ритму с преимущественным выведением в ночное время и регулируется пищеварительным каналом почками и костной тканью. Пиридоксина гидрохлорид всасывается в тонком кишечнике с током крови разносится к тканям и проникая в клетки фосфорилируется с участием АТФ и пиридоксалькиназ. Распад коферментов осуществляется путем дефосфорилирования и окисления в тканях. Основным продуктом катаболизма является 4-пиридоксиловая кислота которая экскретируется с мочой.

Показания

Установленный дефицит магния изолированный или связанный с другими состояниями.

Способ применения и дозы

Перед приемом препарата необходимо проконсультироваться с врачом. Взрослым внутрь по 2 капсулы 2-3 раза в день. Продолжительность курса лечения -1-2 месяца. Капсулы принимают во время еды запивая стаканом воды. Лечение следует прекратить после нормализации концентрации магния в крови.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин) фенилкетонурия детский возраст.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности препарат может применяться только по рекомендации врача. Магний проникает в грудное молоко. Следует избегать применения препарата в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции к компонентам препарата. Расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта (диарея боли в животе запор тошнота рвота метеоризм).

Передозировка

Симптомы передозировки: падение артериального давления тошнота рвота замедление рефлексов угнетение дыхания кома остановка сердца и паралич сердца анурия. Лечение: регидратация форсированный диурез. При почечной недостаточности необходим гемодиализ или перитонеальный диализ.

Взаимодействие с другими препаратами

При применении других лекарственных средств следует обязательно проинформировать об этом врача или же проконсультироваться с врачом или фармацевтом о возможности применения препарата "Магвит". Одновременное применение препаратов содержащих фосфаты или соли кальция может значительно уменьшить всасывание магния в желудочно-кишечном тракте. Препараты магния снижают всасывание тетрациклина рекомендуется делать интервал в 3 часа перед применением Магвита. Магний ослабляет действие пероральных тромболитических средств уменьшает усвоение железа.

Особые указания

В случае сопутствующего дефицита кальция дефицит магния должен быть устранен до начала введения дополнительного приема кальция. При частом употреблении слабительных средств алкоголя повышенных физических и с психических нагрузках потребность в магнии возрастает что может привести к развитию дефицита магния в организме. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Не влияет.

Срок хранения после открытия

2 года. Не использовать позже срока годности указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранят в сухом защищенном от света месте при температуре от 15 до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.