Инструкция по применению
Макмирор Комплекс Суппозитории вагинальные 8 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Италия
Производитель: Dompe Farmaceutici
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Нистатин+Нифурател
Количество в упаковке: 8
Дозировка действующего вещества: 500 мг+200 000 МЕ



Действующее вещество

Нистатин+Нифурател

Состав

нифурател 500 мг, нистатин 200 тыс. МЕ. Вспомогательные вещества: диметилполисилоксан АК 1000 (диметикон) 960.0 мг. Состав оболочки: желатин 351.0 мг глицерин (глицерол) 171.0 мг, этилпарагидроксибензоат натрия 1.8 мг, пропилпарагидроксибензоат натрия 1.0 мг, титана диоксид 0.4 мг, железа оксид желтый 2.4 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Проведенные исследования подтверждают, что при вагинальном применении у животных (кролики и собаки) с повторным введением суточной дозы, что в 30 раз превышало терапевтическую дозу, вещества, входящие в состав препарата не оказывают системного действия. Проведенные исследования фармакокинетики препарата у человека, так же подтверждают, что при интравагинальном применении, препарат практически не всасывается с поверхности слизистой оболочки влагалища и не оказывает системного действия. Концентрация нифуратела в плазме крови ниже предела количественного определения. максимальная концентрация (Cmax) 4.54 нг /мл, время достижения максимальной концентрации (Tmax) 8.0 ч, интегральная площадь под фармакокинетической кривой концентрация-время (AUC) 10.27 нг мл-1 ч. Нистатин не всасывается через кожу и слизистые оболочки при местном применении.

Показания

Вульвовагинальные инфекции, вызванные чувствительными к препарату возбудителями в т. ч.: бактериальный вагинит, трихомониаз влагалища, вагинит, вызванный грибами рода Candida, смешанные вагиниты.

Способ применения и дозы

Интравагинально: 1 вагинальный суппозиторий вводится ежедневно вечером перед сном в течение 8 дней либо в соответствии с рекомендациями врача. При необходимости лечение можно повторить после менструации. Для достижения максимального эффекта суппозиторий вводят глубоко во влагалище.

Противопоказания

гиперчувствительность к нифурателу, нистатину или какому-либо вспомогательному веществу препарата, детский возраст.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности возможно, если потенциальная польза для матери превышает риск для плода или ребенка. Возможно применение в период грудного вскармливания, т. к. препарат практически не всасывается через слизистые оболочки, поэтому в грудное молоко не проникает.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции в виде кожной сыпи или зуда. При развитии аллергических реакций применение препарата необходимо прекратить.

Передозировка

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Не установлено клинически значимого взаимодействия крема Макмирор Комплекс с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Суппозитории не применяют для лечения в детском возрасте, при необходимости применения препарата у данной категории пациентов, рекомендуется применять препарат Макмирор Комплекс в лекарственной форме крем вагинальный в комплекте с аппликатором (градуированным шприцем). Наличие специальной насадки позволяет ввести крем, не повреждая девственную плеву. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Применение препарата не влияет на способность управлять автотранспортом и иную деятельность, требующую повышенного внимания.