Инструкция по применению
Максидекс Капли глазные 5 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Бельгия
Производитель: Alcon Laboratories
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Дексаметазон
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.1%
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Дексаметазон

Состав

На 1 мл: дексаметазон 1 мг. Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, гидроксипропилметилцеллюлоза, вода очищенная.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Максидекс не предоставлены.

Показания

- аллергический блефарит;- аллергический конъюнктивит;- аллергический кератоконъюнктивит;- острый и хронический ирит;- иридоциклит;- профилактика и лечение воспалительных реакций в послеоперационном периоде;- термический и химический ожог (после полной эпителизации дефектов роговицы).

Способ применения и дозы

Препарат закапывают по 1-2 капли в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (или глаз) каждые 3-6 ч.

Противопоказания

- вирусные, бактериальные и грибковые инфекции глаз;- заболевания роговицы в сочетании с дефектами эпителия;- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности Максидекс должен назначаться только в тех случаях, когда ожидаемый терапевтический эффект превышает потенциальный риск для плода или ребенка.При необходимости назначения препарата в период лактации следует прервать грудное вскармливание.

Побочные действия

Со стороны органа зрения: при длительном местном применении ГКС могут отмечаться: повышение внутриглазного давления с возможным последующим развитием глаукомы; образование задней субкапсулярной катаракты; замедление процесса заживления ран (при заболеваниях, вызывающих истончение роговицы или склеры, возможно прободение фиброзной оболочки).После применения препаратов, содержащих ГКС, может наблюдаться развитие вторичной инфекции (в т.ч. грибковой), как следствие подавления защитной реакции организма пациента. При острых гнойных заболеваниях глаза ГКС могут маскировать или усилить имеющийся инфекционный процесс. Появление на роговице незаживающих язв после длительного лечения стероидными препаратами может свидетельствовать о развитии грибковой инвазии.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата Максидекс не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимое лекарственное взаимодействие препарата Максидекс с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания

При применении препаратов, содержащих ГКС, более 10 дней следует регулярно измерять внутриглазное давление.Препарат предназначен только для местного применения (не применяется для инъекций).Во время лечения не рекомендуется носить контактные линзы.Следует избегать прикосновения кончика капельницы к каким-либо поверхностям, чтобы избежать микробного загрязнения содержимого флакона.Перед применением следует встряхнуть содержимое флакона.Использование в педиатрииВ настоящее время безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены.

Условия хранения

Беречь от детей