Инструкция по применению
Максилак Капсулы 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Франция
Производитель: Danisco
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 24 мес



Описание

Рекомендуется в качестве источника пробиотических микроорганизмов для восполнения бактериальной флоры пищеварительного тракта и сохранения ее нормального состава. Особенно рекомендован: Во время и/или после приема препаратов (в том числе антибиотиков), которые могут вызвать изменения качественного и/или количественного состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта. В качестве комплексной коррекции состояний, требующих эрадикации H.pylori При проявлениях кишечных инфекций и пищевых отравлений При функциональных расстройствах кишечника: диарее, нарушении пищеварения, запоре, метеоризме (вздутии живота), тошноте, отрыжке, рвоте, боли и дискомфорте в животе и пр. При проявлениях, связанных с пищевой аллергией, дерматитами В период сезонных всплесков инфекционных заболеваний для поддержки иммунитета. Пробиотические штаммы лакто- и бифидобактерий способствуют дополнительной защите при стрессах, смене климата, места пребывания, рациона и режима питания, в том числе во время путешествий, диеты, при посещении детского организованного коллектива

Состав

СИНБИОТИК МАКСИЛАК® представляет собой комплекс из 9 (девяти) пробиотических штаммов в концентрации 4,5 млрд КОЕ** и пребиотика (фруктоолигосахариды), которые дополняют и усиливают действие друг друга. **КОЕ - колониеобразующая единица (показатель качества жизнеспособных микроорганизмов).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника пробиотических микроорганизмов (бифидобактерии, лактобациллы) и молочнокислых микроорганизмов. Особенно рекомендован: • Во время и/или после приема препаратов (в том числе антибиотиков), которые могут вызвать изменения качественного и/или количественного состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта • В качестве комплексной коррекции состояний, требующих эрадигации H. pylori • При проявлениях кишечных инфекций и пищевых отравлений • При функциональных расстройствах кишечника: диарее, нарушении пищеварения, запоре, метеоризме (вздутии живота), тошноте, отрыжке, рвоте, боли и дискомфорте в животе и пр. • При проявлениях, связанных с пищевой аллергией, дерматитами • В период сезонных всплесков инфекционных заболеваний1 для поддержки иммунитета.

Способ применения и дозы

Рекомендации по применению: Взрослым и детям старше 3-х лет по 1 капсуле 1 раз в день во время еды (предпочтительно вечером). При приеме детьми родители должны убедиться, что ребенок в состоянии проглотить капсулу. Продолжительность приема - не менее 10 дней, при необходимости прием можно продлить до 1 месяца Прием можно повторять 2-3 раза в год. Капсулу следует проглатывать целиком, запивая водой комнатной температуры. При невозможности детьми проглотить капсулу рекомендуем использовать синбиотик Максилак Бэби в форме порошка. СИНБИОТИКА МАКСИЛАК® можно принимать с первого дня прима антибиотиков и продолжать в течение 2-4 недель после окончания курса антибиотикотерапии.2 Применять СИНБИОТИК МАКСИЛАК® следует в комплексной коррекции следующих состояний: • При эрадикации H. pylori в качестве дополнительного средства в течение 7-10 или 14 дней в зависимости от схемы основного лечения3: • При расстройствах желудочно-кишечного тракта, вызванных кишечными инфекциями или обусловленных приемом антибиотиков (антибиотик-ассоциированная диарея), которые сопровождаются нарушением стула, болевыми ощущениями в животе в течение 5-10 дней в первые дни4 и продолжать прием до 4 недель в период восстановления5 (выздоровления): • Для снижения риска кишечных расстройств при смене климата, рациона и режима питания (путешествие, диеты, посещение детских организованных коллективов и пр.) начать прием СИНБИОТИКА МАКСИЛАК® за 3-5 дней до предстоящего события и продолжать в течение 1-2 недель после (или на протяжении всей поездки)6; • В период сезонных всплесков респираторных инфекционных заболеваний для поддержки иммунитета и снижения заболеваемости ОРВИ прием СИНБИОТИКА МАКСИЛАК® может составлять до 2 месяцев7. • При проявлениях, связанных с пищевой аллергией, и дерматитах принимать в течение 1 месяца. При необходимости период приема может быть продлен по назначению врача.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище Не является лекарственным средством. Не применять в качестве основного источника питания. СИНБИОТИК МАКСИЛАК® может применяться во время беременности и кормления грудью. Перед применением проконсультироваться с врачом. Перед применением БАД детьми рекомендуется проконсультироваться с врачом-педиатром. 1\. Bailey MT, Cryan J R, The microbiome as a key regulator of brain, behavior and immunity: Commentary on the 2017 named series. Brain Behav Immun. 2017 Nov: 66:18-22. 2\. Szajewska H., Canani R.B., Guarino A., et al; ESPGHAN Working Group for Probiotics Prebiotics. Probiotics for the Prevention of Antibiotic-As-sociated Diarrhea in Children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016; 62(3): 495-506. 3\. Guidelines Management of Helicobacter pylori infection>the Maastricht V /Florence Consensus Report on behalf of the European Helicobacter and Microbiota Study Group and Consensus panel. 4\. Szajewska H., Guarino A., Hojsak I., Indrio F., Kolacek S., Shamir R., Vandenplas Y., Weizman Z.; European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. Use of probiotics for management of acute gastroenteritis: a position paper by the ESPGHAN Working Group for Probiotics and Prebiotics. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014; 58(4): 531-9. 5\. А.А. Плоскирева, 2015 ТАКТИКА ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ А.А. ПЛОСКИРЕВА ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии», клинический отдел инфекционной патологии, г. Москва 6\. McFarland LV. Meta-analysis of probiotics forthe prevention of traveler s diarrhea. Travel Med Infect Dis. 2007; 5:97 105 7\. Effect of longterm consumption of probiotic milk on infections in children attending day care centres: double blind, randomised trial».2001 Jun 2:322(7298):1327 Hatakka K1, Savilahti E, Рцпкд A, Meurman JH, Poussa T, Nflse L, Saxelin M, Korpela R 8\. Lenoir-Wijnkoopl, SandersME. CabanaMD, etal. Probiotic and prebiotic influence beyond the intestinal tract Nutr Rev 2007; 65:469-89 9\. СФЕРА (всесторонняя защита путем заморозки и замедленного высвобождения)

Условия хранения

В сухом месте