Инструкция по применению
Макситрол Капли глазные 5 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Бельгия
Производитель: Alcon Laboratories
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Дексаметазон+Неомицин+Полимиксин В
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.1%
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Дексаметазон+Неомицин+Полимиксин В

Состав

Дексаметазон 1 мг,неомицин 3.5 мг,полимиксина В сульфат 6 тыс. ЕД

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция низкая.

Показания

Инфекции глаз и его придатков:- блефарит;- конъюнктивит;- кератоконъюнктивит;- кератит;- иридоциклит.Профилактика послеоперационных инфекционных осложнений.

Способ применения и дозы

Местно. При нетяжелом инфекционном процессе по 1-2 капле в конъюнктивальный мешок 4-6 раз/сут.При остром тяжелом инфекционном процессе по 1-2 капле в конъюнктивальный мешок каждые 60 мин с уменьшением частоты инстилляций препарата по мере уменьшения явлений воспаления.

Противопоказания

- индивидуальная гиперчувствительность к компонентам препарата;- вирусные заболевания глаз (в т.ч. кератит, вызванный Herpes simplex, ветряная оспа);- микобактериальная инфекция глаз;- туберкулезные заболевания глаз;- острый опоясывающий лишай;- грибковые заболевания глаз;- состояние после удаления инородного тела роговицы;- гнойная инфекция слизистой оболочки глаза и век, вызванная устойчивыми к действию неомицина микроорганизмами, гнойная язва роговицы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности и кормления грудью нет. Возможно применение для лечения беременных по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов. Следует прервать использование препарата на период кормления грудью.

Побочные действия

Местные. Аллергическая реакция, сопровождающаяся зудом и припухлостью век, гиперемией конъюнктивы. Побочные эффекты, обусловленные стероидным компонентом: повышение внутриглазного давления с возможным последующим развитием глаукомы, поражением зрительного нерва и полей зрения (при использовании препарата более 10 дней необходимо мониторирование внутриглазного давления); задняя субкапсулярная катаракта, замедление процесса заживления ран. Местное применение стероидов при заболеваниях, вызывающих истончение роговицы или склеры, может приводить к их перфорации.Вторичная инфекция. Развитие вторичной инфекции наблюдается после применения комбинированных препаратов, содержащих ГКС в комбинации с антибиотиками. При длительном применении стероидов возможно развитие грибковых инфекций роговицы. Появление на роговице незаживающих язв после длительного лечения стероидными препаратами может свидетельствовать о развитии грибковой инвазии. Вторичная бактериальная инфекция может возникнуть как следствие подавления защитной реакции организма больного.

Передозировка

За время использования глазных капель «Макситрол» случаев передозировки не указано.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами в настоящее время не известно.В случае использования с другими местными офтальмологическими препаратами интервал между их применением должен составлять не менее 10 мин.

Особые указания

Флакон необходимо закрывать после каждого использования. Перед применением флакон встряхивать.

Условия хранения

В сухом месте