Инструкция по применению
Мамоклам Таблетки 100 мг 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: МЕГА-ФАРМ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ламинарии слоевища
Количество в упаковке: 40
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Ламинарии слоевища

Состав

1 таблетка содержит:Активное вещество: субстанция Клам 100 мг в т.ч. высшие жирные кислоты 30%, йод (в пересчете на сухое вещество) 0.1%.Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 4 мг, кальция стеарат - 2 мг, крахмал картофельный - 104 мг, лактоза - 160 мг, магния карбонат - 14 мг, повидон - 45 мг, сахароза - 1 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 250 мг.Состав пленочной оболочки: гипромеллоза - 9 мг, макрогол 6000 - 2.94 г, титана диоксид - 2.94 мг, хлорофилл-медь - 0.12 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

- Лечение мастопатии как в виде монотерапии, так и в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Препарат Мамоклам применяют внутрь до еды, разовая доза – 1-2 таб., 2-3 раза/сут с равными промежутками в течение дня (суточная доза 3-6 таб.), продолжительность курса лечения от 1 до 3 месяцев.При необходимости рекомендуется повторять курсы лечения после перерыва от 2 недель до 3 месяцев.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;- тяжелые заболевания почек;- гипертиреоз;- токсическая аденома щитовидной железы, многоузловой зоб;- фурункулез, хроническая пиодермия;- геморрагический диатез.

Применение при беременности и кормлении грудью

Во время беременности и кормления грудью возможно применение йода только в физиологических дозах: не более 250 мг/сут.

Побочные действия

Мамоклам обычно хорошо переносится. У небольшого числа пациентов отмечаются следующие побочные эффекты.Проявления индивидуальной непереносимости, в основном, в виде кожного зуда, покраснения кожных покровов и кожных высыпаний. Со стороны ЖКТ: изжога, метеоризм, диарея.При длительном применении – явления йодизма (в т.ч. ринит, отек Квинке, слюнотечение, слезотечение, угри).

Передозировка

Явлений передозировки при применении препарата Мамоклам не выявлено.

Взаимодействие с другими препаратами

При применении препарата Мамоклам в терапевтических дозах организм получает йод в дозах, несколько превышающих рекомендуемую физиологическую дозу данного микроэлемента, в связи с чем, Мамоклам не следует применять с препаратами, содержащими йод.

Особые указания

Лечение мастопатии рекомендуется проводить под контролем врача онколога или гинеколога.

Условия хранения

В сухом месте