Инструкция по применению
Манорен Таблетки шипучие 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки шипучие
Страна: Россия
Производитель: Глобал Хэлфкеар
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 20



Описание

Действие Манорена определяется свойствами входящих в его состав лимонной кислоты, натрия гидрокарбоната, натрия цитрата, D-маннозы и дигидрокверцетина. Лимонная кислота, натрия гидрокарбонат и натрия цитрат растворяют и предупреждают образование мочекислых камней за счет ощелачивания мочи, а также снижают выведение кальция, улучшают растворимость кальция оксалата в моче, ингибирует образование кристаллов и, следовательно, препятствует образованию кальций-оксалатных камней. D-манноза оказывает антиадгезивное действие в отношении большинства инфекционных агентов, образующих биопленки на поверхности и внутри камней, оказывает профилактическое действие в отношение развития инфекций мочевыводящих путей. Бактерии, теряя способность прикрепляться к слизистой, выводятся с током мочи. Дигидрокверцетин - натуральный антиоксидант, получаемый из древесины лиственницы сибирской. Улучшает капиллярную микроциркуляцию органов и тканей, в том числе почек. В результате активизируются защитные механизмы и восстановления почек. Дезинтоксикационные свойства дигидрокверцетина заключаются в прямом взаимодействии с токсинами, связывании их в стабильную форму с последующим выведением из организма. За счет улучшения капиллярного кровотока ускоряется процесс выведения токсинов из межклеточного пространства. 2 шипучие таблетки (суточная дозировка) содержат: лимонная кислота - 1624 мг, натрия гидрокарбонат - 2367,2 мг, натрия цитрат - 2000 мг, D-манноза - 496 мг, дигидрокверцетин 90 % - 9,6 мг. Внешний вид: белые шипучие таблетки без риски.

Состав

Натрия гидрокарбонат, натрия цитрат безводный, кислота лимонная безводная, маннит, D-манноза, стабилизатор полиэтиленгликоль, ароматизатор «персик-маракуйя» (ароматические ингредиенты, декстроза, мальтодекстрин, регулятор кислотности диацетат натрия, носитель гуммиарабик), L-лейцин, подсластитель сукралоза, дигидрокверцетин.

Форма выпуска

Таблетки шипучие

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника дигидрокверцетина. Литолиз уратных камней, уратно-оксалатных. Предупреждение образования кальций-оксалатных камней. Профилактика образования цистиновых камней. Профилактика инфекционно-воспалительных процессов при литотрипсии.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды, предварительно растворив в 1 стакане (200 мл) воды. Рекомендуется употребление 2-2,5 литров жидкости в сутки. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости курс приема можно повторить. Возможны повторные приемы в течение года.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, детский возраст.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.