Инструкция по применению
Мараславин раствор для местного применения 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Болгария
Производитель: Софарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Трава полыни понтийской+Трава чабера+Бутоны гвоздичного дерева
Количество в упаковке: 1

Действующее вещество

Трава полыни понтийской+Трава чабера+Бутоны гвоздичного дерева

Состав

100 мл трава полыни понтийской (Herba Artemisiae pontici) 4.196 г трава чабера (Herba Saturejae hortensis) 728 мг бутоны гвоздичного дерева (Flores Caryophylli) 3.646 г плоды черного перца (Fructus Piperis nigri) 1.199 г корневища зингибера (Rhyzoma Zingiberis) 4.196 г. Вспомогательные вещества: динатрия эдетат - 1 мг, натрия гидроксид - 0.24 мг.

Форма выпуска

Раствор

Показания

— геморрагическая форма пародонтоза с альвеолярными карманами . — гнойная форма пародонтоза (в составе комплексной терапии) . — послеоперационный период при хирургическом лечении пародонтоза.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данных о применении препарата при беременности и в период лактации не предоставлено.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции. При плотном наложении тампонов возможен субфебрилитет, обусловленный нарушением оттока гнойного экссудата, который исчезает самостоятельно после снятия тампонов.

Особые указания

Возможно: аллергические реакции. При плотном наложении тампонов возможен субфебрилитет, обусловленный нарушением оттока гнойного экссудата, который исчезает самостоятельно после снятия тампонов.