Инструкция по применению
Маример Капли назальные Флаконы-капельницы 5 мл 12 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Франция
Производитель: Biocodex
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Морская вода
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 36



Действующее вещество

Морская вода

Состав

На 100 мл:действующее вещество: стерильный изотонический раствор морской воды 31,82 мл;вспомогательные вещества: вода очищенная до 100 мл.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Маример не предоставлены.

Показания

— острые и хронические воспалительные заболевания носа, придаточных пазух и носоглотки;— профилактика инфекционных заболеваний носа и носоглотки;— аллергический и вазомоторный риниты;— профилактика воспалительных процессов после оперативных вмешательств;— ежедневная гигиена носовой полости для сохранения защитных свойств слизистой оболочки в условиях повышенной сухости или загрязнения воздуха (в т.ч. кондиционирование, центральное отопление).

Способ применения и дозы

Препарат применяется интраназально.Капли назальные: детям в возрасте до 1 года назначают по 2 кап. в каждый носовой ход с лечебной целью 4 раза/сут; детям старше 1 года и взрослым - по 2 кап. в каждый носовой ход с лечебной целью 4-6 раз/сут, с гигиенической целью - 1-4 раза/сут.Детям в возрасте до 2 лет промывание полости носа следует производить в положении лежа. Следует повернуть голову ребенка набок, промыть верхний носовой ход, затем повторить процедуру с другим носовым ходом. Посадить ребенка, вытереть выделения из носа.Детям старше 2 лет и взрослым следует наклонить голову набок, промыть верхний носовой ход, повторить процедуру с другим носовым ходом.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение препарата Маример при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Данные о передозировке препарата Маример не предоставлены.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами в составе комбинированной терапии.

Особые указания

Необходимо консультация врача, если препарат применяется после операции. Безопасная и удобная насадка позволяет без риска применять препарат у новорожденных. Одноразовый флакон открывают поворотом насадки. Насадка полностью отделяется и может быть использована для закрывания флакона. Открытый флакон следует использовать в течение суток.

Условия хранения

Беречь от детей