Инструкция по применению
МАСТОДИНОН ТАБЛ.ГОМЕОП. N120

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Bionorica
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 120
Дозировка действующего вещества: 162 мг+ 81 мг+ 81 мг+ 81 мг+ 81 мг+ 162 мг+ 81 мг



Описание

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, от белого со светло-желтым оттенком до белого со светло-коричневым оттенком цвета, возможны вкрапления более темного цвета.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

1 таблетка препарата содержит: Активные компоненты: Vitex agnus castus (Agnus castus) Ø 162,0 мг Caulophyllum thalictroides D4 81,0 мг Cyclamen europaeum (Cyclamen) D4 81,0 мг Strychnos ignatii (Ignatia) D6 81,0 мг Iris versicolor (Iris) D2 162,0 мг Lilium lancifolium (Lilium tigrinum) D3 81,0 мг Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, магния стеарат, лактозы моногидрат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве симптоматического средства по рекомендации врача в комплексной терапии: * предменструального синдрома, сопровождающегося мастодинией, напряжением молочных желез, психической лабильностью, запорами, отеками, головной болью/мигренью, * фиброзно-кистозной мастопатии, * нарушений менструального цикла и/или бесплодия, вызванных недостаточностью желтого тела.

Способ применения и дозы

Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день, с небольшим количеством жидкости. Для достижения оптимального лечебного эффекта рекомендуется продолжать приём препарата в течение 3 месяцев (в том числе и во время менструации). Если при приеме препарата Мастодинон® симптомы сохраняются в течение 3 месяцев, следует проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Беременность и период грудного вскармливания. Возраст до 12 лет. Непереносимость лактозы, дефицит лактазысиндром глюкозо-галактозной мальабсорбции (в состав препарата входит лактоза).

Применение при беременности и кормлении грудью

Во время беременности показания к приему препарата Мастодинона® автоматически исчезают. Данные, полученные в результате исследований репродуктивной токсичности, подтверждают, что Vitex agnus castus влияет на выработку молока. Препарат не рекомендуется принимать во время кормления грудью. Фертильность: Vitex agnus castus может влиять на женскую фертильность посредством регулирования менструального цикла.

Побочные действия

Возможны тяжелые аллергические реакции с отеком лица, одышкой и дисфагией. Могут возникать кожные аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница), желудочно-кишечные расстройства (тошнота, боль в эпигастральной области), головная боль, головокружение, акне, нарушения менструального цикла. Частота нежелательных реакций неизвестна (не может быть оценена на основе имеющихся данных). При появлении описанных выше нежелательных реакций или других нежелательных реакций, не указанных в инструкции, прием препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Передозировка

Возможны расстройства желудочно-кишечного тракта у пациентов с непереносимостью лактозы. В случае передозировки - симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно снижение эффективности препарата при одновременном приеме антагонистов дофаминовых рецепторов, а также не исключена возможность взаимодействия с агонистами дофаминовых рецепторов, эстрогенами и антиэстрогенами. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Мастодинон® проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Препарат Мастодинон® следует применять по рекомендации и под наблюдением врача. Пациенткам, принимающим агонисты дофаминовых рецепторов, антагонисты дофаминовых рецепторов, эстрогены или антиэстрогены, перед применением препарата Мастодинон® необходимо проконсультироваться с врачом. При обострении симптомов заболевания период применения препарата следует обратиться к врачу. Пациенткам со злокачественными эстрогензависимыми опухолями в анамнезе или заболеваниями гипофиза в анамнезе перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом. Применение препарата способствует постепенной нормализации гормонального баланса, в связи с чем возможны нарушения менструального цикла. Если во время приема препарата Мастодинон® наступит беременность, прием препарата следует прекратить. Достаточные сведения о применении препарата у детей в возрасте до 12 лет отсутствуют. Мастодинон® не должен применяться у детей в возрасте с 12 лет до начала регулярных менструаций в период полового созревания. При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. Курение, употребление химических стимуляторов, кофе и алкоголя оказывают отрицательное воздействие на эффективность гомеопатических лекарственных средств. Для пациенток с сахарным диабетом: 1 таблетка препарата Мастодинон® содержит около 0,02 «хлебных единиц». Препарат не содержит глотен. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Исследований влияния препарата Мастодинон® на способность управлять транспортными средствами и механизмами не проводилось. При приеме в рекомендуемых дозах препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке (блистер, пачка картонная), при температуре не выше 25 0С. Хранить в недоступном для детей месте!