Инструкция по применению
Мастопол Таблетки гомеопатические 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Алкой
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 75 мг+75 мг+75 мг+75 мг
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

1 таблетка содержит:Активное вещество: Conium maculatum (кониум макулатум (кониум)) (Conium) C6 75 мг, Thuja occidentalis (Thuja) (туя окциденталис (туя)) C6 75 мг, Hydrastis canadensis (Hydrastis) (гидрастис канаденсис (гидрастис)) C3 75 мг, Calcium fluoratum (кальциум флюоратум) C6 75 м.Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 282 мг, крахмал картофельный - 15 мг, кальция стеарат - 3 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

- комплексное лечении фиброзно-кистозной мастопатии, мастодинии.

Способ применения и дозы

По 1 таб. 3 раза/сут под язык до полного растворения за полчаса до еды или через 1 ч после еды. Курс лечения - 8 недель. Возможно повторение курса по согласованию с врачом.

Противопоказания

— повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата;— возраст до 18 лет;— недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо- галактозная мальабсорбция;— препарат не применяют при лечении злокачественных заболеваний молочной железы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

До настоящего времени информация о случаях побочных эффектов не поступала. Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических. препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Препарат применяют по рекомендации и под наблюдением врача-маммолога.При приеме гомеопатических препаратов может отмечаться временное обострение симптомов. В этом случае следует обратиться к врачу.При отсутствии терапевтического эффекта в течение 50 дней, а также появлении побочных эффектов, следует обратиться к врачу.Применение препарата проводят строго по назначению и под наблюдением врача-маммолога.Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и.т.п.).Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в максимальной суточной дозе препарата соответствует 0.074 хлебной единицы.

Условия хранения

В сухом месте