Инструкция по применению
Матарен плюс крем для нар.прим 30г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: Штада
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мелоксикам
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24



Действующее вещество

Мелоксикам

Состав

1 туба содержит:Активное вещество: мелоксикам 30 мг, настойка плодов перца стручкового 100 мгВспомогательные вещества: хлороформ - 25 мг, масло кориандра (масло эфирное кориандровое) - 2.5 мг, масло лаванды (масло эфирное лавандовое) - 2.5 мг, парафин жидкий (масло вазелиновое медицинское) - 50 мг, пропиленгликоль - 25 мг, стеариновая кислота (стеариновая кислота 50) - до 20 мг, моноглицериды дистиллированные (Dimodan HP) - до 20 мг, воск эмульсионный - 7.5 мг, глицерол (глицерин дистиллированный) - 25 мг, полоксамер (эмуксол 268) - 5 мг, карбомер (карбопол) - 3 мг, натрия гидроксид - 0.6 мг, имидомочевина (Germall;) - 3 мг, вода (вода очищенная) - до 1 г.

Форма выпуска

Крем

Показания

- воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата;- ревматические поражения мягких тканей;- болевой синдром: бурсит, тендинит, люмбаго, ишиас, невралгия, миалгия, артралгия, радикулит, посттравматический болевой синдром (травматические ушибы, вывихи, растяжения связок, мышц и сухожилий, разрывы мышц без нарушения целостности кожных покровов), болезненность мышц и суставов, вызванных тяжелыми физическими нагрузками.

Способ применения и дозы

Наружно. Слегка втирают полоску крема длиной от 1 до 5 см, кратность применения - 1-3 раза/сут. Количество крема и частота применения могут варьировать в зависимости от площади нанесения и индивидуальной реакции на крем. Для усиления эффекта можно наложить сухую согревающую повязку.

Противопоказания

- детский возраст до 12 лет;- нарушения целостности кожных покровов и воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения препарата;- повышенная чувствительность к компонентам препарата.С осторожностью следует назначать препарат при нарушении функций почек и печени, выраженной патологии ЖКТ (язвенная болезнь желудка и двенандцатиперстной кишки в фазе обострения), выраженной патологии системы крови, в детском возрасте от 12 до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата противопоказано при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Возникающие побочные эффекты зависят от индивидуальной чувствительности. Возможны аллергические реакции со стороны кожи (зуд, кожная сыпь), шелушение кожи, гиперемия.При появлении каких-либо побочных эффектов пациент должен прекратить применение крема и обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки препарата Матарен Плюс неизвестны.

Взаимодействие с другими препаратами

В настоящее время нет данных о взаимодействии препарата Матарен Плюс с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата на поврежденную поверхность кожи, в глаза и на слизистые оболочки. При попадании крема Матарен Плюс на данные участки следует удалить его с помощью ватного тампона, пропитанного вазелином или растительным маслом.После использования препарата необходимо тщательно вымыть руки.Пациенту следует проконсультироваться с врачом перед совместным применением крема Матарен Плюс с другими НПВС, а также при необходимости использования препарата более 10 суток.

Условия хранения

Беречь от детей