Инструкция по применению
Мебендазол Таблетки 100 мг 6 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Авва Рус
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Мебендазол
Количество в упаковке: 1



Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки от белого до светло-желтого цвета с фаской и риской.

Действующее вещество

Мебендазол

Состав

На одну таблетку: Действующее вещество: мебендазол (в пересчете на 100 % вещество) - 100,0 мг, Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный - 30,0 мг, кросповидон (XL) - 12,0 мг, гипролоза - 6,0 мг, натрия стеарилфумарат - 6,0 мг, тальк - 6,0 мг, лактозы моногидрат* - 140,0 мг. * - масса лактозы моногидрата может изменяться в зависимости от количественного содержания мебендазола и содержания воды в фармацевтической субстанции мебендазола.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Практически не всасывается в кишечнике. После приема препарата в дозе 100 мг два раза в день в течение трех дней подряд, концентрация в плазме крови мебендазола и его метаболита (2-аминопроизводного) не превышает 0,03 мкг/мл и 0,09 мкг/мл, соответственно. Связь с белками плазмы - 90 %. Неравномерно распределяется по органам, накапливается в жировой ткани, печени, личинках гельминтов. В печени метаболизируется до 2-аминопроизводного, не обладающего антигельминтной активностью. Период полувыведения 2,5-5,5 часов. Более 90 % дозы удаляется через кишечник в неизмененном виде. Всосавшаяся часть (5-10 %) выводится почками.

Показания

Энтеробиоз, аскаридоз, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихоцефалез, трихинеллез, тениоз, как при моноинвазии, так и при смешанных гельминтозах, эхинококкоз (при невозможности оперативного лечения).

Способ применения и дозы

Внутрь с небольшим количеством воды. Взрослым и детям старше 3 лет. При энтеробиозе - однократно по 100 мг/сутки (1 таблетка), курс лечения 1 день. Так как реинфекция при энтеробиозе встречается довольно часто, то лечение следует повторить через 2 и 4 недели. Рекомендуется проводить одновременное лечение всех членов семьи. При аскаридозе, трихоцефалезе, анкилостомозе и смешанных гельминтозах: 200 мг/сутки (1 таблетка утром, 1 таблетка вечером), курс лечения 3 дня. При тениозе, стронгилоидозе. Взрослым: 400 мг/сутки (2 таблетки утром, 2 таблетки вечером), курс лечения 3 дня. Детям старше 3 лет: 200 мг/сутки (1 таблетка утром, 1 таблетка вечером), курс лечения 3 дня. При эхинококкозе. Взрослым и детям старше 14 лет: в первые три дня по 500 мг 2 раза в день, в последующие 3 дня дозу увеличивают до 500 мг 3 раза в день, в дальнейшем дозу повышают до 1000-1500 мг 3 раза в день. Средняя продолжительность лечения эхинококкоза, вызванного Echinococcus granulosis, составляет 4-6 недель, вызванного Echinococcus multilocularis - до двух лет. При трихинеллезе в 1-й день 3 раза в день по 200-300 мг, во 2-й день 4 раза в день по 200- 300 мг, а с 3 по 14 день - 3 раза в день по 500 мг.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к мебендазолу, другим компонентам препарата, язвенный колит, болезнь Крона, печеночная недостаточность, детский возраст (до 3 лет), беременность, период лактации, непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, одновременный прием с метронидазолом, фенитоином, карбамазепином, ритонавиром.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность. Применение препарата при беременности противопоказано. Период кормления грудью. Нет данных о том, проникает ли мебендазол в материнское молоко. При необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание рекомендуется прекратить.

Побочные действия

Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, экзантема, анафилактические и анафилактоидные реакции. Со стороны органов кроветворения: нейтропения. Со стороны органов пищеварения: тошнота, рвота, боли в животе, диарея, повышение активности "печеночных" трансаминаз, щелочной фосфатазы, гепатит (при применении в высоких дозах в течение длительного времени). Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, сонливость, судороги. Со стороны мочевыделительной системы: гиперкреатининемия, гломерулонефрит (при применении в высоких дозах в течение длительного времени). Прочие: выпадение волос (при применении в высоких дозах в течение длительного времени).

Передозировка

Симптомы: абдоминальные боли, тошнота, рвота, диарея. При применении в высоких дозах в течение длительного времени: обратимые нарушения функции печени, гепатит, нейтропения. Лечение: необходимо удалить препарат из желудка, вызвав рвоту или сделав промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Снижает потребность в инсулине у больных сахарным диабетом. Не следует одновременно применять с липофильными веществами. Циметидин может повышать концентрацию в крови, карбамазепин и другие индукторы метаболизма - понижают, в связи с чем следует контролировать концентрацию лекарственных средств в сыворотке крови. Одновременное применение мебендазола и метронидазола следует избегать.

Особые указания

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы или нарушенным всасыванием глюкозы/галактозы этот препарат противопоказан. У пациентов с сахарным диабетом необходимо контролировать концентрацию глюкозы в плазме крови. При длительном приеме необходимо контролировать картину периферической крови, функцию печени и почек. В течение суток после приема запрещается употребление этанола, жирной пищи, прием слабительных препаратов. Обязательно периодическое исследование мазков анальной области и кала после окончания лечения: терапия считается эффективной при отсутствии гельминтов или их яиц в течение 7 последующих дней. Результаты исследования развития синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза указывают на возможную связь между их возникновением и одновременным применением мебендазола и метронидазола. Нет других данных, документирующих случаи такого лекарственного взаимодействия. Именно поэтому следует избегать одновременного применения мебендазола и метронидазола.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Пациентам следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с техникой, поскольку во время лечения может возникать головокружение и наблюдаться сонливость.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.