Инструкция по применению
Мебикар Таблетки 500 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Тетраметилтетраазабициклооктандион
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 500 мг
Срок годности: 24.0



Описание

Анксиолитическое средство (транквилизатор)

Действующее вещество

Тетраметилтетраазабициклооктандион

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Выводится почками в течение 24 ч после введения.

Показания

Неврозы и неврозоподобные состояния (раздражительность, эмоциональная лабильность, тревожность, страх). Тревожно-параноидальный синдром при шизофрении, инволюционных и сосудистых психозах. Хронический вербальный галлюциноз органического генеза. Комплексная терапия для лечения больных с кардиалгиями, ИБС и реабилитации после инфаркта миокарда. Уменьшение влечения к курению табака, этанола, психоактивными средствами, улучшение переносимости нейролептиков и транквилизаторов.

Способ применения и дозы

Применяют внутрь по 0.3-1 г 2-3 раза/сут (независимо от приема пищи). Максимальная разовая доза - 3 г, суточная - 10 г. Курс лечения - до 2-3 мес, при психических заболеваниях - до 6 мес.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к мебикару.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции (кожный зуд), снижение АД, гипотермия (на 1-1.5° С), диспепсия.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает действие снотворных средств.

Особые указания

Снижение АД и температуры тела не являются причиной для отмены терапии и нормализуется самостоятельно. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При комнатной температуре