# Инструкция по применению
# Медомекси Таблетки 125 мг 30 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество:
Этилметилгидроксипиридина сукцинат
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 125 мг




## Описание

Таблетки, покрытые оболочкой белого или почти белого цвета, цилиндрические, с двояковыпуклой поверхностью, без риски.На поперечном разрезе видны два слоя: пленочная оболочка и ядро белого или белого с кремоватым оттенком цвета.

## Действующее вещество

Этилметилгидроксипиридина сукцинат

## Состав

1 таблетка содержит:активное вещество: этилметилгидроксипиридина сукцинат 125 мг, вспомогательные вещества (ядро): целлюлоза микрокристаллическая 40 мг, лактозы моногидрат (сахар молочный) 88 мг, крахмал картофельный 20 мг, повидон (поливинилпирролидон) 14 мг, кроскармеллоза натрия 10 мг, магния стеарат 3 мг, вспомогательные вещества (оболочка): гипромеллоза 6 мг, макрогол 1,25 мг, титана диоксид 2,75 мг.

## Форма выпуска

Таблетки

**Фармакокинетика**

Всасывание и распределениеБыстро всасывается при приеме внутрь (период полуабсорбции - около 1 ч). Время достижения максимальной концентрации (TCmax) при приеме внутрь - 0,5 ч. Максимальная концентрация (Cmax) при приеме внутрь - 50-100 нг/мл.Быстро распределяется в органах и тканях. Среднее время удержания этилметилгидроксипиридина сукцината в организме при приеме внутрь - около 5 ч. МетаболизмМетаболизируется в печени путем глюкуронирования. Идентифицировано 5 метаболитов: 3-оксипиридина фосфат - образуется в печени и при участии щелочной фосфатазы распадается на фосфорную кислоту и 3-оксипиридин, 2-й метаболит - фармакологически активный, образуется в больших количествах и обнаруживается в моче на 1-2 сут. после введения, 3-й - выводится в больших количествах с мочой, 4-й и 5-й - глюкуронконъюгаты.ВыведениеПериод полувыведения при приеме внутрь (T1/2) - 4-5 ч. Быстро выводится с мочой в основном в виде метаболитов (50% за 12 ч) и в незначительном количестве - в неизмененном виде (0,3% за 12 ч). Наиболее интенсивно выводится в течение первых 4 ч после приема препарата. Показатели выведения с мочой неизмененного препарата и метаболитов имеют индивидуальную вариабельность.

**Показания**

Тревожные состояния при невротических и неврозоподобных состояниях, вегето-сосудистая дистония, дисциркуляторная энцефалопатия, легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза, острые нарушения мозгового кровообращения (в составе комбинированной терапии), абстинентный синдром при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств, в составе комплексной терапии острой интоксикации антипсихотическими лекарственными средствами.

**Способ применения и дозы**

Препарат назначают внутрь по 125-250 мг 3 раза в сутки. Начальная доза - 125-250 мг (1-2 таб) 1-2 раза в сутки с постепенным повышением до получения терапевтического эффекта. Максимальная суточная доза - 750 мг (6 таб). Длительность лечения - 2-6 недель.В комплексной терапии при лечении абстинентного синдрома, внутрь 250-500 мг 3 раза в сутки. Лечение прекращают постепенно, уменьшая дозу в течение 2-3 дней.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату, острая печеночная недостаточность, острая почечная недостаточность, детский возраст, непереносимость лактозы, дефицит лактазы и синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Медомекси® противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) в связи с недостаточными данными по эффективности препарата в данные периоды.

**Побочные действия**

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, сухость слизистой оболочки полости рта, диарея.Прочие: аллергические реакции, сонливость.

**Передозировка**

При передозировке возможно нарушения сна (бессонница, в некоторых случаях - сонливость).Лечение: как правило, не требуется - симптомы исчезают самостоятельно в течение суток. В тяжелых случаях при бессоннице - нитразепам 10 мг, оксазепам 10 мг или диазепам 5 мг. При чрезмерном повышении артериального давления (АД) - гипотензивные лекарственные средства под контролем АД.

**Взаимодействие с другими препаратами**

При совместном применении Медомекси® усиливает действие бензодиазепиновых анксиолитиков, противоэпилептических (карбамазепин), противопаркинсонических (леводопа) лекарственных средств, нитратов.Медомекси® уменьшает токсическое действие этанола.

**Особые указания**

Применение в педиатрииМедомекси® не назначают детям в связи с недостаточной изученностью действия препарата.

**Условия хранения**

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.