Инструкция по применению
Мексикор Капсулы 100 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Агроветзащита
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество:
Этилметилгидроксипиридина сукцинат
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 100 мг

Описание

Капсулы.Препарат представляет собой твердые желатиновые капсулы № 2, корпус и крышка желтого цвета. Содержимое капсул – гранулят, содержащий гранулы и порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Этилметилгидроксипиридина сукцинат

Состав

Препарат Мексикор содержит лактозу (сахар молочный) Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приёмом данного лекарственного препарата. Препарат Мексикор содержит красители солнечный закат желтый (Е110) и хинолиновый желтый (Е104) Препарат Мексикор содержит в составе красители солнечный закат желтый (Е110) и хинолиновый желтый (Е104), которые могут вызывать аллергические реакции. Препарат Мексикор содержит: действующее вещество - этилметилгидроксипиридина сукцинат. Каждая капсула содержит 100 мг этилметилгидроксипиридина сукцината. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: крахмал картофельный, лактоза (сахар молочный), повидон К-17 (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский), целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат. Состав твердой желатиновой капсулы: желатин, вода очищенная, титана диоксид Е171, краситель солнечный закат желтый Е110, краситель хинолиновый желтый Е104.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После приема внутрь быстро и полностью всасывается из желудочнокишечного тракта. Быстро распределяется в органах и тканях. Время достижения максимальной концентрации (Tmax) в плазме крови составляет 0,460,50 часа. Среднее время распределения препарата в организме составляют 4,95,2 часа. Метаболизируется в печени путем глюкуронирования. Идентифицировано 5 метаболитов: 3оксипиридина фосфат образуется в печени и при участии щелочной фосфатазы распадается на фосфорную кислоту и 3оксипиридин, 2й метаболит фармакологически активный, образуется в больших количествах и обнаруживается в моче на 12 сутки после приема препарата, 3й выводится в больших количествах почками, 4й и 5й глюкуронконъюгаты. Период полувыведения 4,75 час. В среднем за 12 часов почками выводится 0,3% неизмененного препарата и 50% в виде глюкуроноконъюгата от введенной дозы. Наиболее интенсивно выводится в течение первых 4х часов после приема препарата. Показатели выведения почками неизмененного препарата и метаболитов имеют значительную индивидуальную вариабельность.

Показания

Ишемическая болезнь сердца (в составе комплексной терапии), комплексная терапия ишемического инсульта, дисциркуляторная энцефалопатия, легкие и умеренные когнитивные расстройства.

Способ применения и дозы

Внутрь. Начинают лечение с дозы 100 мг (1 капсула) 3 раза в сутки, постепенно увеличивая дозу в зависимости от клинического течения заболевания и переносимости проводимой терапии. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг, разовая 200 мг. Суточную дозу препарата желательно распределять на несколько приемов в течение дня. Курсовую терапию препаратом заканчивают постепенно, уменьшая ежедневно дозу препарата на 100 мг (1 капсула). Продолжительность курса терапии у больных ишемической болезнью сердца и нарушениями кровообращения головного мозгового не менее 1,52 месяцев. Повторные курсы (по рекомендации врача), желательно проводить в весеннееосенние периоды. При комплексной терапии дисциркуляторной энцефалопатии, легких и умеренных когнитивных расстройств, препарат назначается без ограничения курса лечения по продолжительности, в дозе 100 мг 34 раза в сутки.

Противопоказания

Не принимайте препарат, если: * у Вас аллергия на этилметилгидроксипиридина сукцинат или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша; * у Вас острые нарушения функции печени; * у Вас острые нарушения функции почек; * Вы беременны или предполагаете, что беременны; * Вы кормите ребенка грудью; * у Вас непереносимость некоторых сахаров (препарат содержит лактозу (сахар молочный). Если Вы считаете, что любое из перечисленного относится к Вам, то сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Применение препарата Мексикор во время беременности противопоказано. Не применяйте препарат Мексикор во время беременности. Грудное вскармливание Мексикор противопоказан в период грудного вскармливания. Не применяйте препарат в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Обычно препарат переносится хорошо. В редких случаях возможно появление аллергических реакций, диспептических расстройств, тошноты и сухости во рту диареи, которые быстро исчезают самостоятельно или при отмене препарата. При длительном применении возможно проявление метеоризма, нарушения сна (сонливость или нарушение засыпания).

Передозировка

В связи с низкой токсичностью препарата передозировка маловероятна. При случайной передозировке возможно возникновение симптомов нарушения сна сонливость, бессонница. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо лекарственные препараты. Препарат Мексикор сочетается со всеми препаратами, используемыми для лечения болезней внутренних органов (соматических заболеваний). Важно сообщить лечащему врачу, если Вы принимаете успокаивающие средства и лекарства против бессонницы, например, диазепам или мидазолам (бензодиазепиновые препараты), антидепрессанты, нитраты, препараты для лечения тревожных расстройств, например, фенибут (анксиолитики), препараты для лечения эпилепсии и судорожных припадков, например, вальпроат, ламотриджин (противосудорожные средства) и противопаркинсонические средства, так как препарат Мексикор может усиливать их действие. Препарат Мексикор уменьшает токсические эффекты этилового спирта.

Особые указания

Перед применением препарата Мексикор проконсультируйтесь с лечащим врачом. Обязательно сообщите лечащему врачу, если у Вас непереносимость некоторых сахаров, поскольку препарат содержит лактозу (сахар молочный). Дети и подростки Не применяйте препарат у детей в возрасте от 0 до 18 лет вследствие отсутствия для указанной возрастной группы данных о его эффективности и безопасности. Управление транспортными средствами и работа с механизмами В период применения препарата следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и при занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца. Препарат следует хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует уничтожать препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.