# Инструкция по применению
# Мексикор Капсулы 100 мг 20 шт

## Характеристики




Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: МираксБиоФарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество:
Этилметилгидроксипиридина сукцинат
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 100 мг

## Действующее вещество

Этилметилгидроксипиридина сукцинат

## Состав

Действующее вещество: Этилметилгидроксипиридина сукцинат (Ethylmethylhydroxypyridine succinate)Концентрация действующего вещества (мг): 100

## Форма выпуска

Капсулы

**Фармакокинетика**

ВсасываниеПосле приема внутрь активное вещество препарата Мексикор быстро и полностью всасывается из ЖКТ. Время достижения Cmax в плазме крови составляет 0.46-0.50 ч.РаспределениеБыстро распределяется в органах и тканях. Среднее время распределения препарата в организме составляют 4.9-5.2 ч. МетаболизмМетаболизируется в печени путем глюкуронирования. Идентифицировано 5 метаболитов: 3-оксипиридина фосфат - образуется в печени и при участии щелочной фосфатазы распадается на фосфорную кислоту и 3-оксипиридин; 2-й метаболит - фармакологически активный, образуется в больших количествах и обнаруживается в моче на 1-2 сут после приема препарата; 3-й - выводится в больших количествах почками; 4-й и 5-й - глюкуронконъюгаты.ВыведениеT1/2 - 4.7-5.0 ч. В среднем, за 12 ч с мочой выводится 0.3% неизмененного препарата и 50% от введенной дозы - в виде глюкуроноконъюгата. Наиболее интенсивно активное вещество и его глюкуроноконъюгаты выводятся в первые 4 ч после приема препарата. Показатели выведения почками неизмененного препарата и метаболитов имеют значительную индивидуальную вариабельность.

**Показания**

Ишемическая болезнь сердца (в составе комплексной терапии);комплексная терапия ишемического инсульта;дисциркуляторная энцефалопатия;легкие и умеренные когнитивные расстройства.

**Способ применения и дозы**

Внутрь. Начинают лечение с дозы 100 мг (1 капсула) 3 раза в сутки, постепенно увеличивая дозу в зависимости от клинического течения заболевания и переносимости проводимой терапии. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг, разовая 200 мг. Суточную дозу препарата желательно распределять на несколько приемов в течение дня. Курсовую терапию препаратом заканчивают постепенно, уменьшая ежедневно дозу препарата на 100 мг (1 капсула). Продолжительность курса терапии у больных ишемической болезнью сердца и нарушениями кровообращения головного мозгового не менее 1,5-2 месяцев. Повторные курсы (по рекомендации врача), желательно проводить в весенне - осенние периоды.При комплексной терапии дисциркуляторной энцефалопатии, легких и умеренных когнитивных расстройств, препарат назначается без ограничения курса лечения по продолжительности, в дозе 100 мг 3-4 раза в сутки.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату, острые нарушения функции печени и почек, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены), беременность, период грудного вскармливания.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации.

**Побочные действия**

Обычно препарат переносится хорошо. В редких случаях возможно появление аллергических реакций, диспептических расстройств, тошноты и сухости во рту, диареи, которые быстро исчезают самостоятельно или при отмене препарата. При длительном применении возможно проявление метеоризма, нарушения сна (сонливость или нарушение засыпания).

**Передозировка**

В связи с низкой токсичностью препарата передозировка маловероятна.Симптомы: при случайной передозировке возможно возникновение симптомов нарушения сна - сонливости, бессонницы.Лечение: проводят симптоматическую терапию.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Мексикор усиливает действие противосудорожных средств (карбамазепин), противопаркинсонических средств (леводопа) и бензодиазепиновых анксиолитиков. Мексикор повышает антиангинальную активность нитратов и гипотензивную активность ингибиторов АПФ и бета-адреноблокаторов.Мексикор уменьшает токсические эффекты этанола.

**Особые указания**

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВ период лечения препаратом необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.