Инструкция по применению
Мелатонин-Тева Таблетки 3 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мелатонин
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 3 мг
Срок годности: 36



Описание

Таблетки цилиндрические, двояковыпуклые, от белого до белого с желтоватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Мелатонин

Состав

Препарат Мелатонин-Тева содержит Действующим веществом является мелатонин. Каждая таблетка содержит 3 миллиграмма мелатонина. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, магния стеарат, лактозы моногидрат. Препарат Мелатонин-Тева содержит лактозы моногидрат (см. раздел 2).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Мелатонин-Тева показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет и старше при расстройствах сна, в том числе обусловленных нарушением ритма «сон-бодрствование», таких как резкая смена часовых поясов (десинхроноз).

Противопоказания

Не применяйте препарат Мелатонин-Тева: * если у Вас аллергия на мелатонин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша); * если у Вас есть заболевание, при котором иммунная система поражает собственные здоровые клетки организма (аутоиммунные заболевания); * если у Вас заболевания печени; * если у Вас тяжелые нарушения функции почек (когда в результатах анализа значение клиренса креатинина менее 30 мл/мин); * во время беременности и в период грудного вскармливания; * если Ваш возраст менее 18 лет (в связи с недостаточной изученностью эффективности и безопасности).

Применение при беременности и кормлении грудью

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Мелатонин-Тева проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Данные о применении мелатонина у беременных женщин отсутствуют или ограничены. Применение препарата Мелатонин-Тева противопоказано во время беременности. Грудное вскармливание В связи с тем, что эндогенный мелатонин (вырабатывается в организме) определяется в грудном молоке, вероятно, экзогенный мелатонин (принимается извне) также может проникать в грудное молоко. Не принимайте препарат Мелатонин-Тева, если кормите грудью. Препарат Мелатонин-Тева имеет слабое противозачаточное действие. Не принимайте препарат Мелатонин-Тева, если планируете забеременеть.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Храните при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке (блистер в пачке) для защиты от света.