Инструкция по применению
Мельдоний Южфарм Капсулы 250 мг 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Южфарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Мельдоний
Количество в упаковке: 40
Дозировка действующего вещества: 250 мг

Описание

Твердые желатиновые капсулы № 0, корпус и крышечка белого цвета, непрозрачные. Содержимое капсул - белый или почти белый кристаллический порошок со слабым характерным запахом. Допускается образование агломератов, которые разрушаются при легком надавливании стеклянной палочкой.

Действующее вещество

Мельдоний

Состав

1 капсула содержит: Действующее вещество: мельдония дигидрат - 250 мг. Вспомогательные вещества: крахмал картофельный 8,4 мг, целлюлоза икрокристаллическая (МКЦ-102) - 14,0 мг, кремния диоксид коллоидный - 4,8 мг, магния стеарат - 2,8 мг. Капсула (корпус и крышечка): титана диоксид - 294 (мл), желатин - до 100 %

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После приема внутрь мельдоний быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, биодоступность составляет 7894. Максимальная концентрация (Cmax) в плазме крови достигается через 1-2 часа после приема внутрь. Метаболизируется в организме главным образом в печени с образованием двух основных метаболитов, которые выводятся почками. Период полувыведения (T1/2) при приеме внутрь зависит от дозы, составляет 3-6 часов. Следовые концентрации препарата длительно сохраняются в организме.

Показания

Сниженная работоспособность, Умственные и физические перегрузки.

Способ применения и дозы

Внутрь. Суточная доза для взрослых составляет 500 мг (2 капсулы). Всю дозу применяют с утра в один прием или разделив ее на 2 приема. Курс лечения - 10-14 дней. При необходимости лечение повторяют через 2-3 недели. В связи с возможным возбуждающим эффектом препарат рекомендуется применять в первой половине дня.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к мельдонию или какому-либо другому компоненту препарата, Повышенное внутричерепное давление (в том числе при нарушении венозного оттока, внутричерепных опухолях), Беременность и период грудного вскармливания, Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность Безопасность применения мельдония у беременных женщин не изучена, поэтому, во избежание возможного неблагоприятного воздействия на плод, применение препарата у беременных женщин противопоказано. Период грудного вскармливания Выведение мельдония с молоком и влияние на состояние здоровья новорожденного не изучены. Поэтому, при необходимости применения препарата, следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Мельдоний, как правило, хорошо переносится. Однако у восприимчивых пациентов, а также в случаях превышения рекомендуемой дозы возможно возникновение нежелательных реакций. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нежелательные эффекты классифицированы в соответствии с их частотой развития следующим образом: часто (>l/100 иl/1000 иl/10000 и Нарушения со стороны крови и лимфатической системы: частота неизвестна - эозинофилия. Нарушения со стороны иммунной системы: редко - аллергические реакции (покраснения кожи, кожные высыпания, крапивница, кожный зуд, припухлость, ангионевротический отек). Нарушения со стороны сердца: очень редко - тахикардия. Нарушения со стороны сосудов: редко - снижение или повышение артериального давления. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: часто - диспептические явления. Нарушения со стороны нервной системы: часто - головные боли, частота неизвестна - возбуждение. Общие нарушения: частота неизвестна - общая слабость. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки мельдонием не сообщалось. Препарат малотоксичен и не вызывает тяжелых нежелательных реакций. Симптомы: снижение артериального давления, сопровождающееся головной болью, тахикардией, головокружением и общей слабостью. Лечение: симптоматическая терапия. При тяжелой передозировке необходимо контролировать функции печени и почек.

Взаимодействие с другими препаратами

Мельдоний допускается одновременно применять с нитратами пролонгированного действия и другими антиангинальными средствами, сердечными гликозидами и мочегонными препаратами. Также его можно комбинировать с антикоагулянтами, антиагрегантами, антиаритмическими средствами и другими препаратами, улучшающими микроциркуляцию. мельдоний может усиливать действие нитроглицерина, нифедипина, бета-адреноблокаторов, других гипотензивных средств и периферических вазодилататоров. Одновременное применение препарата вместе с другими препаратами мельдония не допускается, поскольку может увеличиться риск возникновения нежелательных реакций.

Особые указания

Пациентам с хроническими заболеваниями печени и почек следует соблюдать осторожность при длительном применении препарата. При необходимости длительного (более месяца) применения препарата необходимо проконсультироваться со специалистом. Нет достаточных данных о применении препарата у детей до 18 лет. Препарат может давать положительный результат при проведении допинг контроля.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Нет данных о неблагоприятном влиянии на способность управлять транспортным средством и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Однако, учитывая спектр нежелательных реакций, в некоторых случаях следует проявлять осторожность при управлении транспортным средством и выполнении потенциально опасных видов деятельности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 о с. Хранить в недоступном для детей месте.