Инструкция по применению
Мельдоний Реневал Капсулы 500 мг 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Мельдоний
Количество в упаковке: 60

Описание

Твердые желатиновые капсулы № 00 с корпусом и крышечкой белого цвета. Содержимое капсул - порошок или смесь порошка и кристаллов белого или почти белого цвета. Допускается уплотнение содержимого капсулы в комки.

Действующее вещество

Мельдоний

Состав

Препарат Мельдоний Реневал содержит Действующим веществом является мельдония дигидрат. Каждая капсула содержит 500 мг мельдония дигидрата. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал картофельный, кремния диоксид коллоидный (аэросил), магния стеарат. Капсула твёрдая желатиновая: Состав корпуса капсулы: титана диоксид (Е171), желатин. Состав крышечки капсулы: титана диоксид (Е171), желатин.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Мельдоний Реневал показан к применению у взрослых старше 18 лет: в комплексной терапии ишемической болезни сердца (стенокардия, инфаркт миокарда), при хронической сердечной недостаточности и дисгормональной кардиомиопатии, а также в комплексной терапии острых и хронических нарушений кровоснабжения головного мозга (после инсульта, цереброваскулярная недостаточность), при сниженной работоспособности, при умственных и физических перегрузках (в том числе у спортсменов), при синдроме абстиненции при хроническом алкоголизме (в комбинации со специфической терапией алкоголизма). Препарат может давать положительный результат при проведении допинг контроля (см. Особые указания и меры предосторожности).

Способ применения и дозы

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза: Ишемическая болезнь сердца (стенокардия, инфаркт миокарда), хроническая сердечная недостаточность и дисгормональная кардиомиопатия В составе комплексной терапии по 500-1000 мг в день внутрь, принимая всю дозу сразу или разделив ее на 2 приема. Курс лечения - 4-6 недель. Дисгормональная кардиомиопатия - в составе комплексной терапии по 500 мг в день внутрь. Курс лечения - 12 дней. Подострые и хронические нарушения кровоснабжения мозга (после инсульта, цереброваскулярная недостаточность) В составе комплексной терапии после окончания курса инъекционной терапии мельдонием, продолжают лечение пероральным приемом препарата по 500-1000 мг в день, принимая всю дозу сразу или разделив ее на 2 приема. Курс лечения - 4-6 недель. Повторные курсы (обычно 2-3 раза в год) возможны после консультации с врачом. Сниженная работоспособность, умственные и физические перегрузки (в том числе у спортсменов) Взрослым - внутрь по 500 мг 2 раза в день. Курс лечения - 10-14 дней. При необходимости повторить лечение через 2-3 недели. Спортсменам по 500-1000 мг внутрь 2 раза в день перед тренировками. Продолжительность курса в подготовительном тренировочном периоде - 14-21 день, в период соревнований - 10-14 дней. Синдром абстиненции при хроническом алкоголизме (в комбинации со специфической терапией) Внутрь по 500 мг 4 раза в день. Курс лечения - 7-10 дней. Путь и (или) способ введения Мельдоний Реневал принимают внутрь, до приема пищи. Ввиду возможного развития возбуждающего эффекта рекомендуется принимать в первой половине дня и не позже 17:00 при приеме несколько раз в сутки.

Противопоказания

Не принимайте препарат Мельдоний Реневал: если у Вас имеется аллергия на мельдоний или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша), если у Вас имеется повышение внутричерепного давления (при нарушении венозного оттока, внутричерепных опухолях), если Вы беременны, если Вы кормите грудью, если Вам нет 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Не принимайте препарат Мельдоний Реневал во время беременности, так как безопасность применения у беременных женщин не изучена, поэтому, во избежание возможного неблагоприятного воздействия на плод, его применение противопоказано. Грудное вскармливание Не принимайте препарат Мельдоний Реневал во время грудного вскармливания, так как данные о проникновении мельдония в грудное молоко отсутствуют, влияние на состояние здоровья новорожденного не изучено, поэтому, при необходимости применения препарата, следует прекратить грудное вскармливание.Клинические данные по мельдонию отсутствуют.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам Мельдоний Реневал может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Прекратите прием препарата Мельдоний Реневал и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения признаков любых из перечисленных далее нежелательных реакций, которые наблюдались: Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000): аллергические реакции (покраснение кожи, кожная сыпь, зуд, отек). Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): снижение артериального давления, учащенное сердцебиение (тахикардия). Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Мельдоний Реневал. Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): головные боли. Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000): кожный зуд, покраснения кожных покровов, нарушения пищеварительного процесса, сопровождающиеся болью в верхнем отделе живота (диспептические нарушения), Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): общая слабость, увеличение числа эозинофилов в крови (эозинофилия), Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): возбуждение. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или медицинской сестрой. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Мельдоний Реневал больше, чем следовало Если Вы приняли большую дозу, чем Вам следовало, обратитесь за медицинской помощью. Если возможно, возьмите капсулы или коробку с препаратом с собой, чтобы показать врачу. Симптомы: снижение артериального давления, сопровождающееся головной болью, учащенным сердцебиением (тахикардией), головокружением, общей слабостью. Лечение: симптоматическое. В случае передозировки препаратом Вам необходимо немедленно обратиться к врачу. Если Вы забыли принять препарат Мельдоний Реневал Если Вы забыли принять препарат Мельдоний Реневал, не принимайте двойную дозу для компенсации пропущенной, примите следующую дозу в обычное время. При наличии вопросов по приему препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты: что Вы принимали нитроглицерин (препарат, применяемый для профилактики и купирования приступов стенокардии (нарушения кровоснабжения сердечной мышцы)), что Вы принимали нифедипин (препарат, применяемый для профилактики приступов стенокардии (нарушения кровоснабжения сердечной мышцы) и лечения артериальной гипертензии), что Вы принимали бета-адреноблокаторы (например, бисопролол, небиволол, метопролол) - для лечения артериальной гипертензии, нарушений сердечного ритма, сердечной недостаточности (нарушения способности сердца перекачивать кровь), что Вы принимали периферические вазодилататоры и гипотензивные средства (для улучшения кровообращения и лечения артериальной гипертензии), что Вы принимали другие препараты мельдония.

Особые указания

Мельдоний Реневал показан к применению у взрослых старше 18 лет: в комплексной терапии ишемической болезни сердца (стенокардия, инфаркт миокарда), при хронической сердечной недостаточности и дисгормональной кардиомиопатии, а также в комплексной терапии острых и хронических нарушений кровоснабжения головного мозга (после инсульта, цереброваскулярная недостаточность), при сниженной работоспособности, при умственных и физических перегрузках (в том числе у спортсменов), при синдроме абстиненции при хроническом алкоголизме (в комбинации со специфической терапией алкоголизма). Препарат может давать положительный результат при проведении допинг контроля (см. Особые указания и меры предосторожности).Нет данных о неблагоприятном воздействии препарата на способность управлять транспортным средством и выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Хранить в контурной ячейковой упаковке в пачке при температуре ниже 30 °C.