Инструкция по применению
Мельдоний-МосФарма Капсулы 250 мг 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мельдоний
Количество в упаковке: 40
Дозировка действующего вещества: 250 мг

Описание

Твердые желатиновые капсулы № 1, корпус и крышечка белого или почти белого цвета. Содержимое капсул: белый кристаллический гигроскопичный порошок со слабым запахом.

Действующее вещество

Мельдоний

Состав

На 1 капсулу. Действующее вещество: Мельдония дигидрат 250 мг Вспомогательные вещества: Крахмал картофельный 13,6 мг Кремния диоксид коллоидный 5,4 мг Кальция стеарат 2,7 мг Масса содержимого капсулы 271,7 мг Капсула твердая желатиновая № 1: Титана диоксид (Е 171) 2% Желатин до 100%

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После приема внутрь препарат быстро всасывается, биодоступность составляет 78%. Максимальная концентрация (Cmax) в плазме крови достигается через 1-2 часа после приема внутрь. Метаболизируется в организме, главным образом в печени, с образованием двух основных метаболитов, которые выводятся почками. Период полувыведения (T1/2) при приеме внутрь зависит от дозы, составляет 3-6 часов. Следовые концентрации препарата сохраняются в организме длительно.

Показания

Сниженная работоспособность, умственные и физические перегрузки.

Способ применения и дозы

Внутрь. Суточная доза для взрослых составляет 500 мг (2 капсулы). Всю дозу применяют с утра в один прием или разделив ее на 2 приема. Курс лечения - 10-14 дней. Ввиду возможного развития возбуждающего эффекта препарат рекомендуется применять в первой половине дня.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к мельдонию или какому-либо другому компоненту препарата, повышенное внутричерепное давление (в том числе при нарушении венозного оттока, внутричерепных опухолях), беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (безопасность не установлена).

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность Безопасность применения мельдония у беременных женщин не изучена, поэтому, во избежание возможного неблагоприятного воздействия на плод, применение препарата у беременных женщин противопоказано. Период грудного вскармливания Выведение мельдония с молоком и влияние на состояние здоровья новорожденного не изучены. Поэтому при необходимости применения препарата следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Нежелательные лекарственные реакции сгруппированы по системно-органным классам в соответствии со следующей градацией частоты: очень часто (⩾1/10), часто (⩾1/100 и Нарушения со стороны крови и лимфотической системы: частота неизвестна - эозинофилия. Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции (покраснение кожи, кожные высыпания, кожный зуд, припухлость). Нарушения со стороны нервной системы: часто - головные боли, частота неизвестна - повышенная возбудимость. Нарушения со стороны сердца: очень редко - тахикардия. Нарушения со стороны сосудов: очень редко - снижение артериального давления, повышение артериального давления. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: часто - диспепсические явления. Общие расстройства и нарушения в месте введения: частота неизвестна - общая слабость, ангионевротический отёк. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки мельдонием не сообщалось. Препарат малотоксичен и не вызывает тяжелых нежелательных реакций. Симптомы: снижение артериального давления, сопровождающееся головной болью, тахикардией, головокружением и общей слабостью. Лечение: симптоматическая терапия. При тяжелой передозировке необходимо контролировать функции печени и почек.

Взаимодействие с другими препаратами

Мельдоний допускается одновременно применять с нитратами пролонгированного действия и другими антиангинальными средствами, сердечными гликозидами и мочегонными препаратами. Также мельдоний можно применять совместно с антикоагулянтами, антиагрегантами, антиаритмическими средствами и другими препаратами, улучшающими микроциркуляцию. Мельдоний может усиливать действие коронародилатирующих средств, нитроглицирина, нифедипина, бета-адреноблокаторов, других гипотензивных и периферических вазодилятаторов. Недопустимо одновременное применение препарата с другими препаратами мельдония, поскольку может увеличиться риск возникновения нежелательных реакций. Ввиду возможного развития тахикардии и артериальной гипотензии, следует соблюдать осторожность при комбинации с нитроглицерином (для подъязычного применения) и гипотензивными средствами (особенно альфа-адреноблокаторами и короткодействующими формами нифедипина).

Особые указания

Пациентам с хроническими заболеваниями печени и почек следует соблюдать осторожность при длительном применении препарата. Безопасность и эффективность применения мельдония у детей не установлены. С 1 января 2016 года препараты мельдония включены в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агенства (WADA) и могут давать положительный результат при проведении допинг-контроля у спортсменов.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Данные о неблагоприятном влиянии мельдония на способность управлять транспортными средствами и выполнению работ, требующих высокой скорости психомоторных реакций, отсутствуют.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.