Инструкция по применению
Мемоплант таблетки 40 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Dr. Willmar Schwabe
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гинкго двулопастного листьев экстракт
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 40 мг



Действующее вещество

Гинкго двулопастного листьев экстракт

Состав

Мемантина гидрохлорид 40 мг

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Деменция средней и тяжелой степени при болезни Альцгеймера.

Способ применения и дозы

При приеме внутрь начальная доза для взрослых составляет 5 мг/сут. В дальнейшем дозу можно увеличивать еженедельно на 5 мг. Средняя поддерживающая доза - 10-20 мг/сут. Максимальная доза - 20 мг/сут.

Противопоказания

Тяжелая печеночная недостаточность . беременность . период лактации (грудного вскармливания) . детский и подростковый возраст до 18 лет (эффективность и безопасность препарата не изучены) . повышенная чувствительность к мемантину.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, сонливость, нарушение походки, спутанность сознания, галлюцинации, судороги, психоз, повышенная возбудимость. Со стороны пищеварительной системы: запор, рвота, тошнота, панкреатит. Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД, венозный тромбоз, тромбоэмболия. Со стороны организма в целом: грибковые инфекции, общая слабость, повышенная утомляемость, аллергические реакции.

Особые указания

Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, сонливость, нарушение походки, спутанность сознания, галлюцинации, судороги, психоз, повышенная возбудимость. Со стороны пищеварительной системы: запор, рвота, тошнота, панкреатит. Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД, венозный тромбоз, тромбоэмболия. Со стороны организма в целом: грибковые инфекции, общая слабость, повышенная утомляемость, аллергические реакции.