Инструкция по применению
Менопейс Капсулы 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Великобритания
Производитель: Vitabiotics
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 30

Описание

Лекарственный негормональный препарат при симптомах менопаузы.

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

ВсасываниеМенопейс активно всасывается из ЖКТ сразу же после приема. МетаболизмОсновные компоненты препарата метаболизируются в печени. РаспределениеКомпоненты Менопейса распределяются в тканях организма и обнаруживаются в печени (витамин А, В12, фолиевая кислота, магний), жировой ткани (витамины D, E), мышцах (витамин D, цинк), костях (цинк), мозге (магниий), почках (магний), поджелудочной железе (магний), эритроцитах, селезенке, сердце, ногтях. ВыведениеКомпоненты Менопейса и их метаболиты выделяются из организма с желчью (витамины Е, В12, магний), фекалиями (кальция пантотенат, цинк, магний), мочой (витамины Е, А, С, Н, В6, В12, фолиевая кислота, никотинамид, кальция пантотенат, цинк, магнии, йод, кремний) как в неизмененном виде, так и в виде метаболитов.

Показания

В составе комплексной терапии для снижения выраженности вегето-сосудистых расстройств («приливы», повышенное потоотделение, эмоциональная лабильность, головная боль, нарушения сна, беспокойство) в период менопаузы.

Способ применения и дозы

Внутрь. 1 капсула в день во время или после еды, запивать стаканом воды или холодным напитком. Длительность курса и повторные курсы – по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к входящим в состав препарата компонентам.

Применение при беременности и кормлении грудью

Менопейс не рекомендован к применению беременным женщинам и в лактационный период.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Передозировка

Нет сведений.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременное применение других поливитаминных комплексов во избежание передозировки.

Особые указания

Препарат не следует принимать натощак.