Инструкция по применению
МЕНОВАЗИН 40МЛ ФЛАК Р-Р/ИФФ/

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Ивановская Фармацевтическая Фабрика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бензокаин+Прокаин+Рацементол
Количество в упаковке: 1

Описание

Бесцветная прозрачная жидкость с запахом ментола.

Действующее вещество

Бензокаин+Прокаин+Рацементол

Состав

Состсав на 100 мл Действующие вещества: Левоментол - 2,5 г, Прокаина гидрохлорид (новокаина гидрохлорид) - 1,0 г, Бензокаин (анестезин) - 1,0 г, Вспомогательные вещества: Этанол (этиловый спирт) 70 % до 100 мл.

Форма выпуска

Раствор

Показания

В качестве местноанестезирующего средства при невралгиях, миалгиях, артралгиях и зудящих дерматозах.

Способ применения и дозы

Наружно, наносят на кожу над пораженной областью и растирают или наносят на пораженные участки кожи (зудящие дерматозы) 2-3 раза в сутки. Курс лечения продолжается в зависимости от лечебного эффекта, но не более 3-4 недель. При необходимости курс лечения повторяют.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема). Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (в связи с отсутствием данных)

Побочные действия

Аллергические реакции, контактный дерматит. При продолжительном применении возможно головокружение, общая слабость, снижение артериального давления. В этих случаях прекращают применение препарата. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению, передозировка маловероятна. При чрезмерном нанесении или длительном его применении возможно усиление побочных эффектов. Лечение: симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось

Особые указания

Не наносить препарат на воспаленную кожу или при нарушении целостности кожных покровов. Не наносить препарат на слизистые оболочки. Избегать попадания препарата в глаза. При случайном попадании препарата в глаза, следует обильно промыть их водой. После использования препарата рекомендуется вымыть руки. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.