Инструкция по применению
МЕНОВАЗИН Р-Р НАРУЖН. 40МЛ

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Гиппократ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество:
Бензокаин+Прокаин+Рацементол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2,5 г+ 1 г+ 1 г
/100 мл

Описание

Раствор спиртовой для наружного применения прозрачный, бесцветный, с запахом ментола.

Действующее вещество

Бензокаин+Прокаин+Рацементол

Состав

1 мл раствора содержит ментола - 0,025 г, прокаина гидрохлорида (новокаина) - 0,01 г, бензокаина (анестезина) - 0,01 г; вспомогательное вещество: спирт этиловый 70%.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

При наружном применении действующие компоненты препарата практически не поступают в системный кровоток.

Показания

Невралгия, миалгия, артралгия (как местноанестезирующее средство). Зудящие дерматозы (как противозудное средство).

Способ применения и дозы

Наружно. Наносят на пораженные участки кожи или на кожу над пораженной областью и растирают 2-3 раза в сутки. Курс лечения продолжают в зависимости от терапевтического эффекта, но не более 3-4 недели. При необходимости курс лечения повторяют.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушение целостности кожных покровов, воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о влиянии препарата на организм при беременности и лактации отсутствуют. С осторожностью применяют препарат при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Аллергические реакции, контактный дерматит. При длительном применении – головокружение, слабость, снижение артериального давления. В этом случае прекращают применение препарата. Если при применении препарата появляются любые из указанных в инструкции побочных эффектов, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При продолжительном применении возможны головокружение, общая слабость, снижение артериального давления. Терапия симптоматическая.

Взаимодействие с другими препаратами

Компоненты препарата (новокаин, анестезин) снижают антибактериальное действие сульфаниламидных препаратов. Усиливают эффекты препаратов с местноанестезирующим действием. При одновременном применении с другими препаратами для местного применения могут создаваться новые соединения с непредвиденным эффектом.

Особые указания

Не наносить препарат на воспаленную кожу или при нарушении целостности кожных покровов. Не наносить препарат на слизистые оболочки. Избегать попадания препарата в глаза. При случайном попадании препарата в глаза, следует обильно промыть их водой. После использования препарата рекомендуется вымыть руки. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.