Инструкция по применению
Метацин Таблетки 2 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармакор Продакшн
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Метоциния йодид
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 2 мг



Действующее вещество

Метоциния йодид

Состав

Таблетки 1 таб. метоциния йодид 2 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Блокатор м-холинорецепторов, моночетвертичное соединение. Оказывает преимущественное влияние на периферические м-холинорецепторы. Снижает тонус гладкой мускулатуры внутренних органов, уменьшает секрецию желез ЖКТ, бронхиальных и потовых желез, повышает ЧСС, улучшает AV-проводимость. Способность вызывать расширение зрачка, повышение внутриглазного давления и паралич аккомодации выражены в значительно меньшей степени, чем у атропина. Не оказывает центрального действия.

Способ применения и дозы

Спазм гладкой мускулатуры внутренних органов, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит, желчная и почечная колики, гиперсекреция слюнных и бронхиальных желез, премедикация перед операцией с целью уменьшения секреции слюнных и бронхиальных желез, профилактика выкидыша, преждевременных родов.

Противопоказания

Индивидуальный. Взрослым внутрь - по 2-4 мг 2-3 раза/сут. П/к, в/м или в/в - по 0.5 мкг-1 мг 2-3 раза/сут. Максимальные дозы: при приеме внутрь разовая - 5 мг, суточная - 15 мг . при парентеральном введении разовая - 2 мг, суточная - 6 мг.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью следует применять при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при которых увеличение ЧСС может быть нежелательным - мерцательная аритмия, тахикардия, хроническая сердечная недостаточность, ИБС, митральный стеноз, артериальная гипертензия, острое кровотечение . при тиреотоксикозе (возможно усиление тахикардии) . при повышенной температуре тела (может еще повышаться вследствие подавления активности потовых желез) . при рефлюкс-эзофагите, грыже пищеводного отверстия диафрагмы, сочетающейся с рефлюкс-эзофагитом (снижение моторики пищевода и желудка и расслабление нижнего пищеводного сфинктера могут способствовать замедлению опорожнения желудка и усилению гастроэзофагеального рефлюкса через сфинктер с нарушенной функцией) . при заболеваниях ЖКТ, сопровождающихся непроходимостью - ахалазия и стеноз привратника (возможно снижение моторики и тонуса, приводящее к непроходимости и задержке содержимого желудка), атония кишечника у больных пожилого возраста или ослабленных больных (возможно развитие непроходимости), паралитическая непроходимость кишечника (возможно развитие непроходимости) . при заболеваниях с повышенным внутриглазным давлением - закрытоугольная (мидриаз, приводящий к повышению внутриглазного давления, может вызывать острый приступ) и открытоугольная глаукома (мидриатический эффект может вызывать некоторое повышение внутриглазного давления . может потребоваться коррекция терапии), возраст старше 40 лет (опасность проявления недиагностированной глаукомы) . при неспецифическом язвенном колите (высокие дозы могут угнетать перистальтику кишечника, повышая вероятность паралитической непроходимости кишечника . кроме того, возможно проявление или обострение такого тяжелого осложнения, как токсический мегаколон) . при сухости во рту (длительное применение может вызывать дальнейшее усиление выраженности ксеростомии) . при печеночной недостаточности

(снижение метаболизма) и почечной недостаточности (риск развития побочных эффектов вследствие снижения выведения) . при хронических заболеваниях легких, особенно у детей младшего возраста и ослабленных больных (уменьшение бронхиальной секреции может приводить к сгущению секрета и образованию пробок в бронхах) . при миастении (состояние может ухудшаться из-за ингибирования действия ацетилхолина) . вегетативной невропатии (задержка мочи и паралич аккомодации могут усиливаться), гипертрофии предстательной железы без обструкции мочевыводящих путей, задержке мочи или предрасположенности к ней или заболеваниях, сопровождающиеся обструкцией мочевыводящих путей (в т.ч. шейки мочевого пузыря вследствие гипертрофии предстательной железы) . при гестозе (возможно усиление артериальной гипертензии) . при повреждении мозга у детей (эффекты со стороны ЦНС могут усиливаться) . болезнь Дауна (возможно необычное расширение зрачков и повышение ЧСС) . центральный паралич у детей (реакция на антихолинергические лекарственные средства может быть наиболее выражена), тахикардия (может усиливаться).

Побочные действия

При одновременном применении с м-холиноблокаторами, средствами, обладающими антихолинергической активностью, возможно усиление антихолинергического действия.

Особые указания

При одновременном применении с м-холиноблокаторами, средствами, обладающими антихолинергической активностью, возможно усиление антихолинергического действия.