Инструкция по применению
Метадоксил Таблетки 500 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Италия
Производитель: Си Эс Си
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Метадоксин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 500 мг

Описание

Круглые, двояковыпуклые таблетки белого цвета с риской на одной стороне и гравировкой названия препарата на другой стороне.

Действующее вещество

Метадоксин

Состав

Действующее вещество: метадоксин 500 мг. Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Препарат быстро абсорбируется из желудочно-кишечного тракта и имеет высокую биодоступность (60-80 %). Связь с белками плазмы – 50 %. Метаболизируется в печени до активных метаболитов – пиридоксина и пирролидона карбоксилата. Период полувыведения (T1/2) составляет 40 – 60 минут. 45 – 50 % препарата выводится почками в течение 24 часов, 35 – 50 % препарата выводится через кишечник в течение 96 часов.

Показания

Облегчение симптомов вследствие хронической интоксикации алкоголем.

Способ применения и дозы

Внутрь. По 1 таблетке 2 раза в день. Длительность лечения 7 дней. После консультации с врачом лечение может быть продолжено до 2-3 месяцев. Если состояние не улучшается или ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата; период грудного вскармливания; детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Отсутствуют достаточные данные по применению метадоксина во время беременности, поэтому потенциальный риск применения препарата при беременности у человека не установлен. Препарат Метадоксил не следует применять во время беременности. Применение в период грудного вскармливания противопоказано, так как препарат вызывает гипопролактинемию.

Побочные действия

Следует отметить, что в некоторых случаях нежелательные явления сложно отличить от симптомов основного заболевания. Нежелательные реакции классифицированы в соответствии с их частотой развития следующим образом: очень часто (1/10), часто (от 1/100 до ≤1/10), нечасто (от 1/1000 до ≤1/100), редко (от 1/10000 до ≤1 /1000), очень редко (≤1/10000), частота неизвестна (частоту возникновения явлений невозможно определить на основании имеющихся данных). Нарушения со стороны иммунной системы Очень редко: аллергические реакции (гиперчувствительность). Нарушения метаболизма и питания Очень редко: снижение аппетита. Нарушения со стороны нервной системы Очень   редко: периферическая   нейропатия   (потеря   чувствительности,   чувство покалывания, слабость в руках и ногах); головокружение, дезориентация. Желудочно-кишечные нарушения Очень редко: тошнота, диарея, рвота. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей Очень редко: ангионевротический отек, сыпь, крапивница, зуд.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

При совместном применении снижается эффективность леводопы. В случае необходимости совместного применения метадоксина с леводопой следует проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C в защищенном от света месте.   Хранить в недоступном для детей месте!