Инструкция по применению
Метапрот капсулы 250мг N20

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Фармпроект
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Этилтиобензимидазол
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 250 мг

Описание

Капсулы Метапрот обладают ноотропной, антигипоксической, антиоксидантной и иммуномодулирующей активностью, улучшает регенерацию тканей.

Действующее вещество

Этилтиобензимидазол

Состав

Этилтиобензимидазола гидробромид (в форме моногидрата) 250 мг, гипролоза - 3.9 мг, диоксид кремния коллоидный - 9.1 мг, лактозы моногидрат - 133.0 мг, стеарат магния - 4.0 мг.Состав оболочки капсулы: желатин - 94.729 мг, краситель оксид железа желтый (Е172) - 0.0038 мг, краситель оксид железа красный (Е172) - 0.1152 мг, диоксид титана (Е171) - 1.152 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После приема внутрь хорошо всасывается из ЖКТ. После однократного приема обнаруживается в крови через 30 мин. При длительном курсовом непрерывном применении, особенно в высоких дозах, может отмечаться тенденция к кумуляции препарата с повышением его концентрации в крови к 10-12 дню применения.

Показания

— повышение и восстановление работоспособности, в т.ч. в экстремальных условиях (тяжелые физические нагрузки, гипоксия, перегревание),— адаптация к воздействию различных экстремальных факторов,— астенические расстройства различной природы (при неврастении, соматических заболеваниях, после перенесенных тяжелых инфекций и интоксикаций, в пред- и послеоперационном периоде при хирургических вмешательствах),— в составе комплексной терапии перенесенной черепно-мозговой травмы, менингита, энцефалита, нарушений мозгового кровообращения, когнитивных расстройств.

Способ применения и дозы

Препарат назначают внутрь, после еды.Взрослым назначают по 250 мг (1 капс. по 250 мг или 2 капс. по 125 мг) 2 раза/сут. При необходимости суточную дозу повышают до 750 мг (500 мг утром и 250 мг - после обеда), а пациентам с массой тела выше 80 кг - до 1 г (по 500 мг 2 раза/сут).Курс лечения - 5 дней. В зависимости от эффекта терапии проводят в среднем 2-3 курса (реже 1 или 4-6), во избежание кумуляции препарата между курсами рекомендуется делать 2-недельный перерыв.Для повышения работоспособности в экстремальных условиях препарат принимают за 40-60 мин до предстоящей деятельности в дозе 500-750 мг. При продолжении работы повторный прием производят через 6-8 ч в дозе 250 мг. Максимальная суточная доза - 1.5 г, а в последующие сутки - 1 г.

Противопоказания

— гипогликемия,— выраженные нарушения функции печени,— эпилепсия,— артериальная гипертензия,— глаукома,— ИБС,— аритмии,— лактазная недостаточность, непереносимость лактозы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы,— беременность,— период лактации,— детский возраст,— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Побочные действия

Частота возникновения побочных эффектов: очень часто (>10%), часто (1-10%), нечасто (0.1-1%), редко (0.01-0.1%), очень редко (<0.01%, включая единичные случаи с неустановленной частотой).Со стороны ЦНС: очень часто - головная боль, нарушение сна, беспокойство, очень редко - парестезия, судороги.Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень редко - повышение АД, тахикардия.Со стороны пищеварительной системы: редко - тошнота, рвота, неприятные ощущения в области желудка и печени.Аллергические реакции: часто - крапивница, аллергический конъюнктивит, аллергический ринит.Прочие: очень часто - гиперемия лица.При возникновении побочных реакций, в т.ч. не указанных выше, следует снизить дозу или прекратить применение препарата, а также сообщить лечащему врачу.

Передозировка

Симптомы: повышенная возбудимость, нарушение ночного сна.Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, при необходимости - симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Ингибиторы микросомальных ферментов печени CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4 (например, циметидин) могут повышать концентрацию препарата в крови.Метапрот усиливает положительные эффекты метаболических лекарственных средств (в т.ч. инозина), ноотропных препаратов (в т.ч. пирацетам), антигипоксических средств (в т.ч. триметазидин), калия и магния аспарагината, глутаминовой кислоты, витаминов (в т.ч. #-токоферол), а также антиангинальных средств (нитраты, бета-адреноблокаторы).

Особые указания

Препарат не следует принимать в вечернее время (возможно нарушение засыпания). Во время лечения рекомендуется диета, богатая углеводами.