Инструкция по применению
Метилурацил Мазь 10 % 25 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диоксометилтетрагидро-пиримидин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 10%



Описание

Мазь желтоватого, желтовато-коричневого или зеленовато-коричневого цвета с характерным запахом.

Действующее вещество

Диоксометилтетрагидро-пиримидин

Состав

В 100 г мази содержатся: Действующее вещество: диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) - 10 г. Вспомогательные вещества: вазелин, ланолин безводный, вода очищенная. По 25 г в тубы алюминиевые. Тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

При местном применении препарат практически не абсорбируется в системный кровоток.

Показания

Вялозаживающие раны, эрозии и язвы кожи, трещины кожи заднего прохода и молочных желез, ожоги, фотодерматит, переломы костей. Метилурацил может использоваться с профилактической целью для предупреждения реакции кожи при облучении новообразований с невысокой радиочувствительностью, уменьшения радиоэпителиита и поздних сращений стенок (окклюзий) влагалища при лучевой терапии новообразований гениталий.

Способ применения и дозы

Наружно. Местно. Взрослым и детям старше 3-х лет мазь ежедневно наносят на пораженные участки тонким слоем в течение 15-30 дней. Перед нанесением рану следует обработать антисептиком и удалить остатки некротических тканей. В случае лучевой терапии новообразований гениталий для профилактики и лечения радиоэпителиита мазь используют в рыхлых тампонах. Курс лечения индивидуален. Длительность лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к метилурацилу или к другим компонентам препарата, избыточность грануляций в ране.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. На время применения препарата грудное вскармливание прекратить.

Побочные действия

Аллергические реакции, кратковременное жжение в месте нанесения препарата.

Передозировка

Случаи передозировки при местном и наружном применении не описаны.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат совместим с наружными аппликациями антибактериальных и антисептических средств. Одновременное местное применение глюкокортикоидов ослабляет эффект мази.

Особые указания

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения

В прохладном месте +8 +15 градус