Инструкция по применению
Метилурацил Таблетки 500 мг 50 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Усолье-Сибирский Химфармзавод
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Диоксометилтетрагидро-пиримидин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 500 мг
Срок годности: 3

Описание

Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской.

Действующее вещество

Диоксометилтетрагидро-пиримидин

Состав

Диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) 500 мг. Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 120.5 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 21 мг, повидон К17 - 37 мг, твин-80 (полисорбат) - 0.5 мг, кальция стеарат (октадеканоат) - 7 мг, тальк - 14 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Для приема внутрь: лейкопения (легкие формы, в т.ч. возникшая в результате химиотерапии злокачественных новообразований, при рентгено- и лучевой терапии), агранулоцитарная ангина, алиментарно-токсическая алейкия, анемия, тромбоцитопения, интоксикация бензолом, лучевая болезнь, реконвалесценция (после тяжелых инфекций), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, вялозаживающие раны, ожоги, переломы костей, гепатит, панкреатит.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время или после еды, по 500 мг 4 раза в сутки (при необходимости - до 6 раз в сутки), детям от 3 до 8 лет - по 250 мг, старше 8 лет - по 250-500 мг 3 раза в сутки. Курс при заболеваниях органов ЖКТ - 30-40 дней, в других случаях может быть менее продолжительным.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к диоксометилтетрагидропиримидину, лейкоз (лейкемические формы, особенно миелоидные), лимфогранулематоз, гемобластозы, злокачественные заболевания костного мозга, детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

При необходимости применения при беременности и в период грудного вскармливания следует учитывать ожидаемую пользу терапии для матери и возможный риск для плода или грудного ребенка.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции, при приеме внутрь - головная боль, головокружение, изжога.

Особые указания

Препараты, содержащие диоксометилтетрагидропиримидин, следует применять строго в соответствии с показаниями.

Условия хранения

Хранить в обычных условия, в недоступном для детей месте.