Инструкция по применению
Метилурацил Биохимик Таблетки 500 мг 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Биохимик
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Диоксометилтетрагидро-пиримидин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 500 мг
Срок годности: 60.0

Описание

Таблетки метилурацил 500мг - препарат, активирующий обмен веществ в тканях, улучшающий трофику, ускоряющий процессы клеточной регенерации, рост и грануляционное созревание ткани, эпителизацию.

Действующее вещество

Диоксометилтетрагидро-пиримидин

Состав

Метилурацил 500 мг

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Для приема внутрь: лейкопения (легкие формы, в т.ч. возникшая в результате химиотерапии злокачественных новообразований, при рентгено- и лучевой терапии), агранулоцитарная ангина, алиментарно-токсическая алейкия, анемия, тромбоцитопения, интоксикация бензолом, лучевая болезнь, реконвалесценция (после тяжелых инфекций), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, вялозаживающие раны, ожоги, переломы костей, гепатит, панкреатит.Для наружного применения: вялозаживающие раны, ожоги, переломы костей, фотодерматит, трофические язвы, пролежни, глубокие раны.Для местного применения: проктит, сигмоидит, язвенный колит

Способ применения и дозы

Внутрь, во время или после еды, по 500 мг 4 раза/сут (при необходимости - до 6 раз /сут), детям от 3 до 8 лет - по 250 мг, старше 8 лет - по 250-500 мг 3 раза/сут. Курс при заболеваниях органов ЖКТ - 30-40 дней, в других случаях может быть менее продолжительным.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к метилурацилу. Для приема внутрь: лейкоз (лейкемические формы, особенно миелоидные), лимфогранулематоз, гемобластозы, злокачественные заболевания костного мозга. Для наружного и местного применения: избыточные грануляции в ране.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и в период лактации следует соотнести предполагаемую пользу для матери и потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции; при приеме внутрь - головная боль, головокружение, изжога.

Передозировка

При клиническом применении случаев передозировки до этого времени не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает противолучевое действие цистамина.

Особые указания

Лекарственные формы метилурацила следует применять строго по соответствующим показаниям.

Условия хранения

В сухом месте