
Инструкция по применению
Метрогил Гель 1 % 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Индия
Производитель: Юник
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Метронидазол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Метронидазол

Состав

Метронидазол 10 мг.Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, карбомер 940, динатрия эдетат, натрия гидроксид, пропиленгликоль, вода очищенная.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

Всасывание минимальное, после наружного применения геля в сыворотке крови обнаруживаются лишь следовые количества препарата. Всосавшийся метронидазол проходит через плаценту и гематоэнцефалический барьер. Cmax в крови - до 66 нг/мл (при нанесении 1 г геля, эквивалентного 7.5 мг метронидазола).

Показания

— розовые угри (в т.ч. постстероидные);— вульгарная угревая сыпь;— жирная себорея, себорейный дерматит;— трофические язвы нижних конечностей (на фоне варикозного расширения вен, сахарного диабета);— плохо заживающие раны;— пролежни;— геморрой, трещины заднего прохода.

Способ применения и дозы

Для наружного применения. Гель наносят на предварительно очищенные пораженные участки кожи тонким слоем 2 раза/сут, утром и вечером, в течение 3-9 недель. Продолжительность лечения составляет 3-4 месяца, терапевтический эффект обычно отмечается уже после 3 недель лечения.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью - I триместр беременности, период лактации.

Побочные действия

При местном применении геля концентрация метронидазола в крови очень низкая, поэтому риск развития системных побочных эффектов невелик.Редко могут наблюдаться аллергические реакции (крапивница, кожная сыпь); гиперемия, шелушение, легкая сухость и жжение кожи, слезотечение (если гель нанесен близко к глазам).

Передозировка

Случаев передозировки препарата в рекомендуемых дозах при наружном применении препарата не наблюдалось.

Взаимодействие с другими препаратами

При местном применении геля взаимодействие с другими лекарственными средствами незначительно, однако следует соблюдать осторожность при одновременном назначении с варфарином и другими непрямыми антикоагулянтами (увеличивает протромбиновое время).

Особые указания

Избегать попадания в глаза. В случае попадания геля в глаза их следует незамедлительно промыть большим количеством воды.

Условия хранения

Беречь от детей