Инструкция по применению
Метрогил Гель вагинальный 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Индия
Производитель: Юник
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Метронидазол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 24.0



Действующее вещество

Метронидазол

Состав

В 1 г геля: метронидазол 10 мг. Вспомогательные вещества: пропилгидроксибензоат, пропиленгликоль, карбомер-940, динатрия эдетат, натрия гидроксид, вода очищенная.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

После однократного интравагинального введения 5 г Метрогила средняя Cmax препарата в сыворотке крови 237 нг/мл, что составляет 2% от средней Cmax метронидазола при приеме внутрь дозы в 500 мг. Время достижения Cmax составляет 6-12 ч после интравагинального применения однократной дозы 5 г и 1-3 ч после перорального приема метронидазола в дозе 500 мг.; После интравагинального введения препарат подвергается системной абсорбции (около 56%). Проникает в грудное молоко и большинство тканей, проходит через гематоэнцефалический барьер и плаценту. Связывание с белками плазмы - менее 20%. Метаболизируется в печени путем гидроксилирования, окисления и глюкуронирования. Активность основного метаболита (2-оксиметронидазол) - 30% активности исходного соединения.; Относительная биодоступность вагинального геля в 2 раза выше биодоступности одноразовой дозы (500 мг) влагалищных таблеток метронидазола, что обусловлено высокой проникающей способностью препарата во влагалищную жидкость. Поэтому терапевтический эффект после интравагинального введения достигается уже при низких концентрациях метронидазола.; Выводится почками - 60-80% дозы препарата системного действия (20% - в неизмененном виде), кишечником - 6-15% дозы препарата системного действия.

Показания

Бактериальные вагинозы различной этиологии, подтвержденные клиническими и микробиологическими данными; урогенитальный трихомониаз.

Способ применения и дозы

Интравагинально. Рекомендуемая доза составляет 5 г (1 полный аппликатор) 2 раза /сут (утром и вечером). Курс лечения - 5 дней.

Противопоказания

Лейкопения (в т.ч. в анамнезе); нарушения координации движений; органические поражения ЦНС (в т. ч. эпилепсия); печеночная недостаточность; беременность - I триместр; повышенная чувствительность (в т.ч. к производным нитроимидазола).

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение препарата во II и III триместрах беременности. При назначении препарата во время лактации рекомендуется прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Местные реакции: ощущение жжения или учащенное мочеиспускание, вульвит; у полового партнера - ощущение жжения или раздражение полового члена. После отмены препарата - развитие кандидоза влагалища.; Возможно развитие системных эффектов: головокружение, головная боль, сухость во рту, изменение вкусовых ощущений, включая металлический привкус, тошнота, рвота, снижение аппетита, спастические боли в брюшной полости, запор или диарея, окрашивание мочи в темный цвет, лейкопения или лейкоцитоз.; Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница.; В случае возникновения любых нежелательных побочных эффектов необходимо прекратить лечение и обратиться к врачу.

Передозировка

Случаев передозировки препарата при назначении в рекомендуемых дозах не наблюдалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Аналогично дисульфираму вызывает непереносимость этанола.; Усиливает действие непрямых аитнкоагуляптов, не рекомендуется сочетать с недеполяризующими миорелаксантами (векуроний).; При одновременном приеме с препаратами лития может повышаться концентрация лития в плазме крови.; Фенобарбитал ускоряет метаболизм метронидазола за счет индукции микросомальных ферментов печени, циметидин - снижает.

Особые указания

Метрогил; может иммобилизовать трепонемы и приводить к ложноположительному тесту Нельсона.; Во время курса лечения необходимо воздерживаться от половой жизни.; Избегать попадания в глаза.

Условия хранения

Беречь от детей