Инструкция по применению
Метуракол Губка ранозаживляющая коллагеновая для закрытия ран 50 ± 5 мм х 50 ± 5 мм

Характеристики

Форма выпуска: Губка
Страна: Россия
Производитель: Белкозин
Порядок отпуска: по рецепту
Количество в упаковке: 1



Описание

Пластины белого цвета пористой структуры со специфическим запахом и с рельефной поверхностью, толщиной от 7 до 13 мм, размерами (50 ± 5) х (50 ± 5) мм, (90 ± 10) х (90 ±10) мм. Препарат легко впитывает влагу.

Состав

1 г препарата содержит действующие вещества: коллаген, субстанция-раствор 2 % - 47,5 г (0,95 г сухого коллагена), диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) - 0,05 г.

Форма выпуска

Губка

Показания

Трофические язвы, пролежни, глубокие и длительно незаживающие раны, поверхностные ожоги кожи.

Способ применения и дозы

Наружно. Рану предварительно необходимо обработать рас-твором антисептика и удалить остатки некротических тканей. При наличии гнойного отделяемого препарат рекомендуется сочетать с антисептическими растворами, например, гидроксиметилхиноксалиндиоксида (диоксидин), смачивая им губку. Губку извлекают из упаковки непосредственно перед употреблением, соблюдая правила асептики. Количество и размер губки выбирают, в соответствии с площадью и глубиной раны. При необходимости губку режут на куски нужного размера и формы. Губка должна плотно прилегать ко всей поверхности раны и выходить за ее края на 1-1,5 см. При необходимости губку закрывают фиксирующей повязкой или двумя слоями марли. Частота перевязок зависит от глубины и площади раневой поверхности, интенсивности экссудации и наличия некротических масс. Состояние раны контролируют 1 раз в день при незначительном количестве отделяемого и 2 раза в день при обильном. Губку полностью пропитанную отделяемым раны удаляют и заменяют новой. Если губка в ране сухая, перевязку рекомендуется производить 1 раз в 2 -3 дня, за этот срок губка лизируется. Если губка не рассосалась, и нет показаний для перевязки (боль, жжение в области раны, скопление гнойного экссудата, наличие аллергических реакций), ее не снимают. Курс лечения проводят до полной эпителизации, или заполнения раны грануляционной тканью на всю глубину.

Противопоказания

Гиперчувствительность. Наличие в ране избыточных грануляций.

Побочные действия

Аллергические реакции в виде зуда, гиперемии, кратковременного жжения. Боль в области раны (вследствие ее стягивания при высыхании губки).

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат совместим с наружными аппликациями антибактериальных, антисептических и анестезирующих лекарственных средств.

Особые указания

Для устранения боли от стягивания раны губкой необходимо, не снимая губку, смочить ее 0,25% раствором прокаина, или водным 0,02% раствором нитрофурала. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 10 до 30 С. Хранить в недоступном для детей месте.