Инструкция по применению
Мидантан Таблетки покрытые оболочкой 100 мг 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Беларусь
Производитель: Борисовский Завод Медицинских Препаратов
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Амантадин
Количество в упаковке: 100
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 60



Действующее вещество

Амантадин

Состав

В 1 таблетке содержится:Активное вещество: амантадина сульфат 100 мгВспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал картофельный, желатин, лактозы моногидрат, повидон, тальк, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный, кроскармеллоза натрия, титана диоксид, сополимер бутилметакрилата, краситель оранжевый желтый.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Фармакокинетика

После перорального приема хорошо всасывается в ЖКТ. Cmax в плазме крови через 5 ч; T1/2 амантадина сульфата - 12-13ч, амантадина гидрохлорида - 30 ч. Выводится почками в неизменном виде.

Показания

Болезнь Паркинсона, синдром паркинсонизма (ригидность, тремор, гипокинезия). Невралгия при опоясывающем лишае, вызванном вирусом Varicella zoster. Профилактика (в т.ч. в сочетании с вакцинацией) и лечение гриппа А.

Способ применения и дозы

Назначают внутрь после еды. Принимают, начиная с 0,05 - 0,1 г, сначала 2 раза, затем 3-4 раза в сутки. Суточные дозы 0,2 - 0,4 г. Длительность курса лечения 2 -4 мес. Препарат назначают самостоятельно и в сочетании с другими противопаркинсоническими средствами: холинолитиками и L- дофа.Максимальная доза: при приеме внутрь - 0,6 г/сут.

Противопоказания

— печеночная недостаточность;— хроническая почечная недостаточность;— психозы (в анамнезе);— тиреотоксикоз;— эпилепсия;— закрытоугольная глаукома;— гиперплазия предстательной железы;— артериальная гипотензия;— сердечная недостаточность II-III ст.;— возбуждение;— предделирий;— делириозный психоз;— одновременный прием триамтерена и гидрохлоротиазида;— беременность (I триместр);— период лактации;— повышенная чувствительность.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности применение амантадина возможно только по строгим показаниям и под наблюдением врача.В случае необходимости применения в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Со стороны нервной системы: двигательное или психическое возбуждение, судороги, головная боль, головокружение, раздражительность, бессонница, тремор, психические расстройства, сопровождающиеся зрительными галлюцинациями.Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность, тахикардия, ортостатическая гипотензия, аритмогенное действие.Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, тошнота, анорексия, диспепсия.Со стороны мочевыделительной системы: острая задержка мочи у больных с гиперплазией предстательной железы, полиурия, никтурия.Прочие: дерматоз, появление голубоватой окраски кожи верхних и нижних конечностей, снижение остроты зрения.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении возможно усиление побочного действия противопаркинсонических средств.При одновременном применении с тиазидными диуретиками нельзя исключить возможность развития токсических эффектов амантадина (атаксии, возбуждения, галлюцинаций), вероятно, вследствие уменьшения его почечного клиренса.Описан случай острой спутанности сознания у пациента пожилого возраста при одновременном применении с ко-тримоксазолом.При одновременном применении с хинином, хинидином возможно уменьшение выведения амантадина с мочой.

Особые указания

Сведения об эффективности в лечении экстрапирамидных расстройств на фоне лечения антипсихотическими средствами (лекарственный паркинсонизм) противоречивы. Терапию нельзя прекращать внезапно, т.к. возможно резкое обострение заболевания.Употребление этанола на фоне приема препарата противопоказано.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВ период лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте