Инструкция по применению
Микодерил Раствор для наружного применения 1 % 10 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нафтифин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 48



Описание

Прозрачный, бесцветный или слегка желтоватый раствор с запахом этанола.

Действующее вещество

Нафтифин

Состав

В 1 мл раствора содержится: Действующее вещество: нафтифина гидрохлорид - 10,0 мг. Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 50,0 мг, этанол (этиловый спирт 95 %) - 400,0 мг, вода очищенная - до 1 мл.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

Общие для обеих лекарственных форм: грибковые инфекции гладкой кожи и кожных складок (tinea corporis, tinea inquinalis); межпальцевые микозы (tinea manum, tinea pedum); грибковые инфекции ногтей (онихомикозы); кандидоз кожи; отрубевидный лишай; воспалительные дерматомикозы (с зудом или без него). Для раствора для наружного применения 1% дополнительно: лечение микозов, поражающих области кожи с гиперкератозом, а также в зонах роста волос.

Способ применения и дозы

Наружно. При дерматомикозах и кандидозе кожи. Микодерил®, раствор для наружного применения, 1% наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и соседние с ней участки после тщательной очистки и высушивания, захватывая приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения. Длительность лечения: при дерматомикозах - 2-4 недели (при необходимости - до 8 недель), при кандидозах - 4 недели. При поражениях ногтей (онихомикозах). Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами и пилкой для ногтей. Препарат применяют 2 раза в день, длительность лечения при онихомикозах - до 6 месяцев. Для предотвращения рецидивов инфекции следует продолжать применять препарат не менее 2 недель после исчезновения клинических симптомов.

Противопоказания

Общие для обеих лекарственных форм: повышенная чувствительность к нафтифину; беременность и период лактации (безопасность и эффективность препарата у данной категории пациентов не изучена). С осторожностью: детский возраст (опыт клинического применения ограничен). Для раствора для наружного применения дополнительно: повышенная чувствительность к пропиленгликолю; нанесение препарата на раневую поверхность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности в рекомендованных дозах не оказывает неблагоприятного действия на плод.

Побочные действия

В отдельных случаях могут наблюдаться местные реакции: сухость кожи, гиперемия кожи и жжение. Побочные эффекты носят обратимый характер и не требуют отмены лечения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Особые указания

Микодерил®, раствор для наружного применения, 1% эффективен при лечении микозов, поражающих области кожи с гиперкератозом, а так же в зонах роста волос. Требуется курсовое лечение. Следует избегать попадания препарата в глаза и на открытые раны. Использование в педиатрии С осторожностью следует применять препарат у детей. Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами: Микодерил®, раствор для наружного применения, 1% не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте