Инструкция по применению
Микодерил Раствор 1 % 20 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нафтифин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 48



Действующее вещество

Нафтифин

Состав

Состав на 1 мл:Активное вещество: нафтифина гидрохлорид – 10,0 мг.
Вспомогательные вещества: пропиленгликоль – 50,0 мг, этанол (этиловый спирт 95 %) – 400,0 мг, вода очищенная – до 1 мл.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

При наружном применении нафтифин быстро проникает в кожу, создавая устойчивые противогрибковые концентрации в различных ее слоях, что делает возможным егоприменение один раз в день.

Показания

\- грибковые инфекции гладкой кожи и кожных складок (tinea corporis, tinea inquinalis);- межпальцевые микозы (tinea manum, tinea pedum);- грибковые инфекции ногтей (онихомикозы);- кандидоз кожи;- отрубевидный лишай;- воспалительные дерматомикозы (с зудом или без него).

Способ применения и дозы

Наружно.При дерматомикозах и кандидозе кожи.Микодерил, раствор для наружного применения, 1% наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и соседние с ней участки после тщательной очистки и высушивания,захватывая приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения.Длительность лечения: при дерматомикозах - 2–4 недели (при необходимости - до 8 недель), при кандидозах - 4 недели.При поражениях ногтей (онихомикозах).Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами и пилкой для ногтей. Препарат применяют 2 раза в день, длительностьлечения при онихомикозах - до 6 месяцев. Для предотвращения рецидивов инфекции следует продолжать применять препарат не менее 2 недель после исчезновенияклинических симптомов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нафтифину или пропиленгликолю; беременность и период лактации (безопасность и эффективность препарата у данной категории пациентовне изучена).Противопоказано нанесение препарата на раневую поверхность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период лактации не рекомендуется (безопасность и эффективность препарата у данной категории пациентов не изучена).

Побочные действия

В отдельных случаях могут наблюдаться местные реакции: сухость кожи, гиперемия кожи и жжение. Побочное эффекты носят обратимый характер и не требуют отменылечения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие Побочное эффекты, не указанные в инструкции, следуетнемедленно сообщить об этом врачу

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Особые указания

Микодерил, раствор для наружного применения, 1% эффективен при лечении микозов, поражающих области кожи с гиперкератозом, а так же в зонах роста волос. Требуется курсовое лечение.Следует избегать попадания препарата в глаза и на открытые раны.Использование в педиатрии. С осторожностью следует применять препарат у детей.

Условия хранения

Беречь от детей