Инструкция по применению
Микосептин Мазь 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Чехия
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ундециленовая кислота+Ундециленат цинка
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36



Действующее вещество

Ундециленовая кислота+Ундециленат цинка

Состав

Действующее вещество: ундециленовая кислота 50 мг; цинковая соль ундециленовой кислоты 200 мг;Вспомогательные вещества: парафин твердый, парафин жидкий, парафин твердый (точка плавления 64-68°C), вазелин белый, стеариновая кислота, воск белый, метилпарабен, моноглицериды свиного сала (димодан), олеомакрогол (словапол), вода очищенная.Концентрация действующего вещества (мг): 250 мг

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

Профилактика и лечение дерматомикозов, в т.ч. эпидермофитий, и трихофитий кожи нижних конечностей.

Способ применения и дозы

Наружно. Наносят на пораженный участок 2 раза в сутки, после исчезновения клинических признаков - 1 раз в сутки через день; для профилактики - 2 раза в неделю.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

Применение при беременности и кормлении грудью

В периоды грудного вскармливания и беременности возможно применение Микосептина только после консультации врача-гинеколога или врача-педиатра, с учетом всех возможных рисков для плода и новорожденного ребенка.

Побочные действия

Аллергические реакции (редко).

Передозировка

Случаев передозировки при наружном применении не было. При случайном проглатывании мази Микосептин возможно развитие тошноты переходящей в рвоту. Рекомендуют, в домашних условиях, провести промывание желудка и сообщить о происшествии Вашему лечащему врачу. В случае необходимости он назначит соответствующее симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

На данное время не существует достоверных данных о значимом взаимодействии Микосептина с прочими лекарствами.

Условия хранения

В сухом месте