Инструкция по применению
Микостоп Набор 3 в 1 Крем-паста для ногтей 20 мл + Лосьон для ногтей 15 мл + Спрей для ног и обуви 150 мл

Характеристики

Форма выпуска: Набор
Страна: Россия
Производитель: Фармтек
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 3



Описание

МИКОСТОП крем-паста: Свойства: механизм действия крем-пасты МИКОСТОП основан на способности мочевины (карбамида) в концентрации 40% притягивать и удерживать влагу и тем самым разрыхлять и размягчать ткань ногтя до такого состояния, когда она легко удаляется скребком или пилкой для ногтей. Специально разработанная рецептура МИКОСТОП крема-пасты и методика применения обеспечивают условия, когда средство длительно удерживается на поверхности ногтевой пластины и проникает в ее толщу достаточно глубоко, чтобы в полной мере реализовать эффект мочевины. Удаление пораженной ногтевой пластины происходит постепенно и безболезненно. Необходимое количество применений зависит от толщины ногтевых пластин и обширности их поражений. Применяется на ногтях пальцев ног и рук. МИКОСТОП лосьон : Свойства: механизм действия лосьона МИКОСТОП основан на способности проникать в толщу ногтевой пластины и благодаря молочной кислоте снижать уровень pH в ногте, тем самым создавая кислую среду, губительную для жизнедеятельности грибка, а также для распространения инфекции на здоровые ногти. Органические кислоты, такие как молочная кислота и другие, являются хорошо известными соединениями, способными влиять на рост и размножение микроорганизмов, включая грибковые патогены. Дерматомицеты - грибковые патогены чувствительны к низким значениям pH, т.е. к кислой среде, и при уровне pH менее 4,0 рост и размножение грибов прекращаются Данный эффект подтвержден для всех грибов, вызывающих грибковые поражения ногтей. Витамин PP в составе МИКОСТОП лосьона способствует улучшению кровообращение в области ростковой зоны, ускоряя рост здорового ногтя. Применение лосьона МИКОСТОП согласно инструкции позволяет заметно улучшить состояние ногтевой пластины уже за 4 – 8 недель применения и достичь полного восстановления нормальной ногтевой пластины за 6 – 8 месяцев в зависимости от площади и локализации поражения до лечения. МИКОСТОП спрей : Свойства: механизм действия спрея МИКОСТОП основан на физиологическом механизме защиты от грибкового заражения. Известно, что кожа вырабатывает ундециленовую кислоту, которая смешивается с кожным салом и создает на поверхности кожи кислую среду, защищающую от заражения грибком. Чем выше врожденная способность кожи выделять ундециленовую кислоту, тем меньше риск заражения грибковой инфекцией. Активный компонент спрея ундециленамидопропилтримониум метосульфат (TETRANYL U) является современным синтетическим производным ундециленовой кислоты. Он обладает доказанной эффективностью в отношении широкого спектра грибов, вызывающих микозы стоп. Спрей МИКОСТОП выпускается в удобной для обработки форме, а водная основа спрея не портит обувь.

Состав

Состав крем-пасты:вода, мочевина, глицерин, тальк, глицерилстеарат SE, цетеариловый спирт, октилдодеканол, изопропилпальмитат, цетеарет-20, акриламид / акрилоилдиметилтаурат натрия. Изогексадекан, полисорбат 80, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, BHT. Состав лосьона: вода, пропиленгликоль, молочная кислота, PEG-40 гидрогенизированное касторовое масло, ниацинамид, масло лаванды, масло листьев розмарина. Состав спрея: вода, ундециленамидопропилтримонийметосульфат, пропиленгликоль, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, метилизотиазолинон, дециленгликоль, парфюм, динатрий ЭДТА.

Форма выпуска

Набор

Способ применения и дозы

Способ применения: крем-пасты: 1. Нанесите крем-пасту на пораженный ноготь и распределите ее толстым слоем так, чтобы крем-паста не контактировала с кожей. 2. Поверх крем-пасты положите тонкий слой ваты. 3. С помощью пластыря шириной 2-2,5 см наложите крестообразную повязку. Сначала следует наложить пластырь вдоль пальца, затем поперек пальца, чтобы зона перехлеста попадала под ноготь. 4. Через два дня снимите повязку. Размягченный слой ногтя удалите скребком или пилкой для ногтей. Необходимо повторять процедуру до полного очищения ногтевого ложа от измененного грибком ногтя. Обычно до полного удаления пораженных слоев достаточно трехкратного применения. Способ применения: микостоп-лосьона: одну каплю лосьона нанесите на поверхность ногтя и равномерно распределите носиком флакона по всей поверхности, а также по обрезанному краю ногтя. Подождите 1 – 2 минуты, пока необходимое количество жидкости впитается в ноготь. Применяйте МИКОСТОП лосьон утром и на ночь не менее 8 недель, затем только на ночь до полного восстановления нормального вида ногтя. Способ применения: МИКОСТОП спрея: Для профилактики заражения грибком спрей МИКОСТОП распыляйте на поверхность кожи стоп, ногти, межпальцевые промежутки непосредственно после контакта с поверхностями и предметами, потенциально зараженными грибком. Для противогрибковой обработки обуви спрей МИКОСТОП тщательно распыляйте на внутреннюю поверхность обуви ежедневно на ночь 3-5 дней. Обработку проводите ежемесячно в течение всего курса лечения, чтобы к моменту излечения исключить риск повторного заражения. Обработке подлежит вся обувь, которая использовалась после заражения грибком.