Инструкция по применению
Микозон Крем для наружного применения 2 % 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Индия
Производитель: Аджио Фармасьютикалз
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Миконазол
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Миконазол

Состав

В 1 г крема содержится:Активное вещество: миконазола нитрат - 20 мгВспомогательные вещества: пропиленгликоль, парафин мягкий белый, цетостеариловый спирт, цетомакрогол 1000, парафин светлый жидкий, динатрия эдетат, натрия гидрофосфат, хлорокрезол, вода очищенная.

Форма выпуска

Крем

Показания

Дерматомикозы, вызванные грибами, чувствительными к препарату (в т.ч. при вторичном инфицировании грамположительными микроорганизмами).

Способ применения и дозы

Наружно. Крем наносят на вымытую и тщательно высушенную кожу, слегка втирая в пораженные участки 2 раза в день (утром и вечером). При необходимости применяют окклюзионную повязку.Лечение продолжают до полного исчезновения симптомов и в течение нескольких последующих дней для предупреждения рецидивов. В процессе терапии проводят микологический контроль, результаты которого и определяют продолжительность лечения (обычно его длительность - 2-6 недели).

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, С осторожностью - сахарный диабет, нарушение микроциркуляции.

Применение при беременности и кормлении грудью

При местном применении миконазол не всасывается. Препарат можно использовать во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

При гиперчувствительности к компонентам препарата, отмечаются местные аллергические реакции - покраснение кожи, ощущения жжения и покалывания на месте применения препарата; в редких случаях - крапивница, отек, сыпь, эритема.

Передозировка

Применение препарата в повышенных дозах не вызывает каких-либо реакций и состояний, опасных для жизни.В случае непредусмотренного применения препарата (внутрь) возможны следующие симптомы: анорексия. тошнота, рвота, гастралгий, нарушение функции печени; редко -сонливость, галлюцинации, полпакиурия, кожные аллергические реакции. Специфического антидота нет. Необходимо назначать внутрь активированный уголь. При необходимости лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает действие непрямых антикоагулянтов, пероральных гипогликемических лекарственных средств, фенитоина.

Особые указания

В случае если у пациента наблюдается раздражение кожных покровов, либо развивается повышенная чувствительность (проявляются аллергические реакции) в ходе применения данного лекарственного средства, лечение следует прекратить и назначить курс соответствующей терапии.Не рекомендуется применение крема свыше 4-х недель. Только для наружного применения. Не допускать попадания препарата в глаза.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении