Инструкция по применению
Микройодид таблетки 100 мкг 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Калия йодид
Количество в упаковке: 100
Дозировка действующего вещества: 100 мкг



Действующее вещество

Калия йодид

Состав

Калия йодид 130.8 мкг, в т. ч. йод 100 мкг, Вспомогательные вещества: лактоза, сахар-рафинад, кальция стеарат, аэросил.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Микройодид не предоставлены.

Показания

— профилактика развития эндемического зоба, — профилактика рецидива зоба после его хирургического удаления, — лечение диффузного эутиреоидного зоба у новорожденных, детей, подростков и взрослых пациентов молодого возраста.

Способ применения и дозы

Профилактика развития эндемического зоба, Новорожденным и детям: 50-100 мкг йода/сут. Подросткам и взрослым: 100-200 мкг йода/сут. При беременности и в период грудного вскармливания: 150-200 мкг йода/сут. Профилактика рецидива зоба после его хирургического удаления100-200 мкг йода ежедневно, Лечение диффузного эутиреоидного зоба, Новорожденным, детям и подросткам: 100-200 мкг йода/сут. Взрослым пациентам молодого возраста: 300-500 мкг йода/сут. Суточную дозу препарата следует принимать в один прием, после еды, запивая большим количеством жидкости. Продолжительность приема Микройодида определяет врач. Применение препарата с профилактической целью проводится в течение, как правило, нескольких месяцев или лет, а часто - в течение всей жизни. У детей и подростков обычно требуется проведение курса лечения от 6 до 12 месяцев.

Противопоказания

— выраженный тиреотоксикоз, — скрытый тиреотоксикоз (при применении в дозах, превышающих 150 мкг/сут), — герпетиформный дерматит, — токсическая аденома, узловой зоб при применении в дозах более 300 мкг/сут (за исключением предоперационной терапии с целью блокады щитовидной железы), — повышенная чувствительность к йоду. Микройодид не следует принимать при гипотиреозе, за исключением тех случаев, когда развитие последнего вызвано выраженным дефицитом йода. Следует избегать назначения препарата при терапии радиоактивным йодом, наличии или при подозрении на рак щитовидной железы.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период лактации потребность в йоде повышается. Микройодид назначают по показаниям в тех случаях, когда поступление йода с пищей составляет менее 150-300 мкг/сут. Препарат хорошо проникает через плацентарный барьер и может вызвать развитие гипотиреоза и зоба у плода. Йод также выделяется с грудным молоком. Поэтому при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) препарат следует применять только в рекомендуемых дозах.

Побочные действия

Со стороны эндокринной системы: при длительном применении препарата в высоких дозах (более 300 мкг/сут) возможно развитие йод-индуцированного гипертиреоза (особенно у пожилых пациентов, при наличии узлового зоба или токсической аденомы), при применении препаратов йода в высоких дозах (более 1 мг/сут) в отдельных случаях возможно развитие зоба и гипотиреоза. Аллергические реакции: редко - реакции повышенной чувствительности в сочетании с "йодным" ринитом, йододерма, эксфолиативный дерматит, отек Квинке, в отдельных случаях - "йодизм", который может проявляться металлическим привкусом во рту, отечностью и воспалением слизистых оболочек (ринит, конъюнктивит, бронхит), йодной лихорадкой, йодными угрями, отеком слюнных желез. При применении Микройодида по показаниям в рекомендуемых дозах развитие побочных эффектов маловероятно.

Передозировка

Данные по передозировке препарата Микройодид не предоставлены.

Взаимодействие с другими препаратами

Эффективность лечения тиреостатиками при одновременном приеме йода уменьшается. Калия перхлорат и калия тиоцианат подавляют поглощение йода щитовидной железой. Тиреотропный гормон улучшает усвоение йода щитовидной железой и стимулирует выработку ее гормонов. Прием йода в высоких дозах и одновременное назначение калийсберегающих диуретиков может привести к развитию гиперкалиемии. Одновременное назначение препаратов йода в высоких дозах и препаратов лития способствует развитию зоба и гипотиреоза.