Инструкция по применению
Мирлокс таблетки 7,5мг N20

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Польша
Производитель: Гедеон Рихтер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Мелоксикам
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 7,5 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Мелоксикам

Состав

1 таблетка содержит: Мелоксикам 7,5 мг. Вспомогательные вещества: Лактоза, крахмал кукурузный, натрия цитрат, мальтодекстрин, кросповидон микронизированный, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

- Симптоматическое лечение остеоартроза. - Симптоматическое лечение ревматоидного артрита. - Симптоматическое лечение анкилозирующего спондилоартрита (болезнь Бехтерева).

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь во время приема пищи 1 раз/сут. При ревматоидном артрите: Рекомендуемая доза составляет 15 мг/сут. В зависимости от лечебного эффекта дозу можно уменьшить до 7.5 мг/сут. При остеоартрозе: Рекомендуемая доза – 7.5 мг/сут. При неэффективности дозу можно увеличить до 15 мг/сут. При анкилозирующем спондилоартрите: Доза составляет 15 мг/сут. Максимальная суточная доза не должна превышать 15 мг. У пациентов с повышенным риском развития побочных эффектов, а также у пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени, находящихся на гемодиализе: Доза не должна превышать 7.5 мг/сут. Для удобства дозирования возможно применение препарата: Мирлокс табл. 7,5 мг уп. 20 Гродзиский фармацевтический завод Польфа о.о.о.

Противопоказания

- "Аспириновая" астма. - Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения. - Тяжелая печеночная недостаточность . - Почечная недостаточность тяжелой степени (если не проводится гемодиализ). - Детский возраст до 15 лет. - Беременность. - Лактация (грудное вскармливание). - Повышенная чувствительность к компонентам препарата. С осторожностью следует применять препарат у пациентов пожилого возраста, при эрозивно-язвенных поражениях ЖКТ в анамнезе.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Передозировка

Симптомы: нарушение сознания, тошнота, рвота, боли в эпигастрии, кровотечение из ЖКТ, острая почечная недостаточность, печеночная недостаточность, остановка дыхания, асистолия. Лечение: промывание желудка, прием активированного угля (в течение ближайшего часа после приема), проведение симптоматической терапии. Колестирамин ускоряет выведение мелоксикама из организма. Форсированный диурез, защелачивание мочи, гемодиализ малоэффективны из-за высокой связи мелоксикама с белками крови. Специфического антидота не существует.

Особые указания

Следует с осторожностью применять препарат у пациентов с указанием в анамнезе на язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также у пациентов, получающих антикоагулянтную терапию. У таких пациентов повышен риск возникновения эрозивно-язвенных поражений ЖКТ. С осторожностью и под контролем показателей функции почек следует применять препарат у пациентов пожилого возраста, пациентов с хронической сердечной недостаточностью с явлениями недостаточности кровообращения, у пациентов с циррозом печени, а также у пациентов с гиповолемией в результате хирургических вмешательств. При почечной недостаточности, если КК более 25 мл/мин коррекции режима дозирования не требуется. У пациентов, находящихся на диализе, максимальная доза препарата составляет 7.5 мг/сут. Пациенты, принимающие одновременно мочегонные средства и мелоксикам, должны получать достаточное количество жидкости. Если в процессе лечения возникли аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, крапивница), а также фотосенсибилизация, пациент должен обратиться к врачу с целью решения вопроса о прекращении приема препарата. Применение при нарушениях функции печени: Противопоказан при тяжелой печеночной недостаточности . Применение при нарушениях функции почек: У пациентов с повышенным риском развития побочных эффектов, а также у пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени, находящихся на гемодиализе, доза не должна превышать 7.5 мг/сут. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами: Применение препарата может вызывать возникновение нежелательных эффектов в виде головной боли и головокружения, сонливости. Если возникают вышеуказанные явления необходимо отказаться от управления транспортными средствами, обслуживания машин и механизмов.

Условия хранения

Препарат следует хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.